

# TAXREF v15, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion

O. Gargominy, S. Tercerie, C. Régnier, T. Ramage,  
P. Dupont, P. Daszkiewicz & L. Poncet



16 décembre 2021

UNITÉ MIXTE DE SERVICE

PATRIMOINE NATUREL



[www.ofb.gouv.fr](http://www.ofb.gouv.fr)



[www.cnrs.fr](http://www.cnrs.fr)



[www.mnhn.fr](http://www.mnhn.fr)

## PARTENAIRES



Programme / Projet: TAXREF, référentiel taxonomique pour la France

Chef de projet : O. Gargominy

Chargé(e)s de mission : P. Antonetti, P. Daszkiewicz, L. Idczak, C. Régnier, G. Simian, S. Tercierie

Citation recommandée :

Gargominy, O., Tercierie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2021. *TAXREF v15, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion*. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. Rapport UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN). 63 pp.

Photos de couverture : Yan BUSKE, Olivier GARGOMINY, Arnaud HORELLOU, Philippe GOURDAIN, Renaud PUISSAUVE, Jean-Philippe SIBLET, Julien TOUROULT.

## TAXREF v15 en un clin d'œil

Version	v14	v15	% d'ajouts par rapport à la v14
<b>Nombre total de noms</b>	630298	657609	4.3%
Classification supra-spécifique	72762	76214	4.7%
Noms d'espèces et d'infra	557536	581395	4.3%
Espèces et infra	211337	216419	2.4%
Espèces	194480	199880	2.8%
Espèces endémiques	21234	21646	1.9%
Espèces introduites	6023	6150	2.1%
Espèces sauvages actuelles <sup>1</sup>	186607	192047	2.9%
Espèces éteintes	350	352	0.6%
Espèces marines	43283	46382	7.2%
Espèces continentales	152768	155187	1.6%
<b>Métropole</b>			
Noms d'espèces et d'infra	359043	372698	3.8%
Espèces et infra	117987	119835	1.6%
Espèces	105969	108151	2.1%
Espèces endémiques	3388	3432	1.3%
Espèces introduites	2388	2426	1.6%
Espèces sauvages actuelles <sup>1</sup>	100435	102703	2.3%
Espèces éteintes	80	80	0.0%
Espèces marines	14237	15330	7.7%
Espèces continentales	92568	93745	1.3%
<b>Outre-mer</b>			
Noms d'espèces et d'infra	237576	249957	5.2%
Espèces et infra	100207	103690	3.5%
Espèces	95060	98534	3.7%
Espèces (hors Guyane)	68825	71695	4.2%
Espèces endémiques	17846	18214	2.1%
Espèces endémiques (hors Guyane)	15295	15639	2.2%
Espèces introduites	4084	4184	2.4%
Espèces sauvages actuelles <sup>1</sup>	91783	95188	3.7%
Espèces éteintes	270	272	0.7%
Espèces marines	30921	33023	6.8%
Espèces continentales	65092	66508	2.2%
<b>Bibliographie</b>			
Nombre de références bibliographiques	23102	31033	34.3%
Nombre de données bibliographiques	429703	478851	11.4%
Nombre de CD_NOM liés à une référence bibliographique	262421	283454	8.0%
Nombre de CD_REF liés à une référence bibliographique	170596	182787	7.1%
<b>Programmes</b>			
Nombre de programmes liés à TAXREF	65	67	3.1%
Nombre de liens programmes diffusés	1525663	1792948	17.5%
<b>Noms vernaculaires</b>			
Nombre total de noms vernaculaires	58143	63833	9.8%
Nombre de noms vernaculaires français	33499	39156	16.9%
Nombre de noms vernaculaires anglais	15332	15344	0.1%

<sup>1</sup> Hors espèces domestiques/cultivées et espèces disparues / éteintes (statuts M/W/X/Y/Z de TAXREF)

Pour toutes remarques ou demandes relatives à TAXREF,  
 utilisez la page « contactez-nous » de l'INPN (thématiques : Référentiel espèces) :  
<https://inpn.mnhn.fr/contact/contacteznous>  
 Pour envoyer de nouvelles publications (voir C.IV) : [taxref@mnhn.fr](mailto:taxref@mnhn.fr)

# Table des matières

AVANT-PROPOS.....	7
PARTIE 1 : MÉTHODOLOGIE.....	9
<b>A. CONTEXTE ET OBJECTIFS.....</b>	<b>9</b>
A.I. OBJECTIFS.....	9
A.II. PORTEE DU REFERENTIEL.....	10
A.II.1 Portée géographique.....	10
A.II.2 Portée taxonomique.....	10
A.II.3 Portée temporelle.....	10
A.III. PERIMETRE DU REFERENTIEL.....	10
A.IV. COORDINATION ET CONSOLIDATION, ROLE DU MNHN.....	10
<b>B. GESTION DES NOMS SCIENTIFIQUES.....</b>	<b>11</b>
B.I. PRINCIPES GENERAUX.....	11
B.II. PERENNITE DES NOMS DIFFUSES.....	11
B.III. REGLES POUR LA CREATION DE NOUVEAUX NOMS.....	12
B.IV. RECOMMANDATIONS NOMENCLATURALES.....	12
<b>C. SOURCES DE L'INFORMATION.....</b>	<b>13</b>
C.I. SOURCES UTILISEES.....	13
C.II. GLOBAL SPECIES DATABASE (GSD).....	14
C.III. CONSOLIDATIONS NATIONALE ET INTERNATIONALE.....	15
C.III.1 Cas des listes de taxons liés à une GSD.....	15
C.III.2 Cas des listes de taxons non liés à une GSD.....	16
C.IV. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	17
C.IV.1 Pour ajout de noms scientifiques.....	17
C.IV.2 Pour ajout de noms vernaculaires.....	17
C.IV.3 Pour occurrences nouvelles dans les territoires français.....	17
C.V. CHOIX DE NOUVELLES SOURCES.....	18
<b>D. BIOGEOGRAPHIE DES TAXONS.....</b>	<b>18</b>
D.I. LOGIQUE REFERENTIELLE ET LOGIQUE D'INVENTAIRE.....	18
D.II. NOTION DE STATUTS BIOGEOGRAPHIQUES.....	18
D.II.1 Définition des statuts biogéographiques.....	19
D.II.2 Attribution des statuts biogéographiques.....	21
D.II.3 Synonymies et gestion des héritages.....	22

<b>E.</b>	<b>STRUCTURE DU REFERENTIEL .....</b>	<b>22</b>
E.I.	STRUCTURE DE LA TABLE TAXREF .....	22
E.I.1	Liste des champs .....	24
E.I.2	Clé primaire .....	26
E.I.3	Contraintes d'intégrité.....	26
E.II.	GESTION DE LA SYNONYMIE .....	26
E.II.1	Cas particulier de la synonymie d'usage .....	26
E.III.	GESTION DE LA CLASSIFICATION .....	27
E.IV.	LIENS VERS LES BASES DE DONNEES SOURCES .....	27
E.V.	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .....	28
E.VI.	NOMS VERNACULAIRES .....	28
E.VI.1	Structure de la table TAXVERN .....	28
E.VI.2	Gestion des héritages de noms vernaculaires .....	29
<b>F.</b>	<b>GESTION DU REFERENTIEL .....</b>	<b>29</b>
F.I.	HISTORIQUE ET SUIVI DES MODIFICATIONS .....	29
F.II.	GESTION DES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES (DOCS-WEB).....	30
F.III.	APPLICATION TAXREF-WEB .....	31
F.IV.	CONTROLES EFFECTUES SUR LE REFERENTIEL .....	34
PARTIE 2 : DIFFUSION.....		35
<b>G.</b>	<b>TELECHARGEMENT.....</b>	<b>35</b>
<b>H.</b>	<b>STRUCTURE DU REFERENTIEL DIFFUSE .....</b>	<b>36</b>
<b>I.</b>	<b>MODIFICATIONS DEPUIS LA VERSION PRECEDENTE .....</b>	<b>38</b>
<b>J.</b>	<b>CAS DES ENREGISTREMENTS (CD_NOM) QUI DISPARAISSENT.....</b>	<b>38</b>
<b>K.</b>	<b>REFERENTIEL EN LIGNE SUR L'INPN .....</b>	<b>39</b>
<b>L.</b>	<b>API.....</b>	<b>39</b>
<b>M.</b>	<b>HISTORIQUE DES DIFFERENTES VERSIONS DE TAXREF DIFFUSEES.....</b>	<b>39</b>
PARTIE 3 : UTILISATION.....		45
<b>N.</b>	<b>UTILISATION DU REFERENTIEL DANS LA GESTION DE DONNEES .....</b>	<b>45</b>
N.I.	PRINCIPES GENERAUX.....	45
N.I.1	Possibilité de gestion multi-référentielle.....	46
N.II.	SUIVI DES MODIFICATIONS.....	46
<b>O.</b>	<b>RECHERCHE DE CORRESPONDANCE (RECONCILIATION).....</b>	<b>46</b>
O.I.	DIRECTIVES .....	47
O.II.	PIEGES .....	47
O.III.	OUTIL DE RECONCILIATION TAXREF_MATCH.....	47
O.IV.	STOCKAGE DES INFORMATIONS DANS LES TABLES DE DONNEES .....	47
PARTIE 4 : ÉTAT D'AVANCEMENT.....		49
<b>P.</b>	<b>MATERIEL ET METHODES.....</b>	<b>49</b>
P.I.	TAXONS TERMINAUX .....	49
P.II.	COUVERTURE GEOGRAPHIQUE.....	49
P.III.	STATUT BIOGEOGRAPHIQUE .....	50
P.IV.	CONTINENTAL / MARIN .....	50
P.V.	GROUPES TAXONOMIQUES.....	50
P.VI.	COMPLETUDE .....	50
<b>Q.</b>	<b>RESULTATS .....</b>	<b>51</b>
Q.I.	MILIEU CONTINENTAL .....	52
Q.II.	MILIEU CONTINENTAL : INSECTES .....	56
Q.III.	MILIEU MARIN .....	60



Figure 1 : Le HMS Beagle dans les eaux de la Terre de Feu, peinture de Conrad Martens réalisée durant Le Voyage du Beagle (1831-1836), provenant de *The Illustrated Origin of Species* de Charles Darwin.

## AVANT-PROPOS

Au début du 18<sup>ème</sup> siècle, notamment avec l'accélération de l'exploration outre-mer et du commerce des ressources naturelles, les espèces de plantes et d'animaux qui arrivent sur les comptoirs européens et les paillasse des scientifiques deviennent tellement nombreuses que les noms pour les désigner se multiplient et se complexifient à outrance. Trouver un standard de nommage devient urgent, et le système de nomenclature binominale de Carl von Linné s'impose, notamment avec la publication en 1753<sup>2</sup> de son *Species plantarum* puis de la dixième édition de son *Systema Naturæ*, en 1758<sup>3</sup>, qui généralise le système de nomenclature binominale.

Au 21<sup>ème</sup> siècle, les urgences en matière de gestion de la biodiversité pressent l'ensemble des acteurs de réunir la connaissance sur l'état et l'évolution de cette biodiversité. Les quantités d'informations collectées sur la nature par trois siècles de naturalistes parcourant la planète entière ou explorant le moindre recoin de leur jardin sont tout simplement énormes, mais complètement disséminées : collections publiques ou privées, littérature volumineuse et éparpillée, carnets de terrains ou fichiers informatiques forment un vaste monde où l'accessibilité n'est pas toujours de mise. Avec l'avènement des technologies de l'information, les bases de données se sont révélées être une clé pour l'accès à l'information. Mais les bases de données du 21<sup>ème</sup> siècle sont comme les hommes du 18<sup>ème</sup> et ceux de maintenant : sans références, difficile d'organiser l'information et de dialoguer.

<sup>2</sup> Linnaeus, C. 1753. *Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas*. Holmiæ. (L. Salvii). 1200 pp.

<sup>3</sup> Linnaeus, C. 1758. *Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*. Holmiæ. (Salvius). 1384 pp.



# PARTIE 1 : MÉTHODOLOGIE

## A. Contexte et objectifs

---

TAXREF est le référentiel taxonomique national pour la faune, la flore et la fonge de France métropolitaine et d'outre-mer, élaboré et diffusé par le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) dans le cadre de la mise en œuvre du Système d'Information de l'Inventaire du Patrimoine naturel (SINP). Ce référentiel est unique pour la France ; il a pour but de lister et d'organiser les noms scientifiques de l'ensemble des êtres vivants recensés sur le territoire. Le référentiel TAXREF est consultable et téléchargeable sur le site internet de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel ([INPN](#)) coordonné par le MNHN.

### A.I. Objectifs

Les objectifs du référentiel taxonomique sont de :

- donner un nom scientifique unique non ambigu pour chacune des espèces de France qui soit consensuel aux niveaux national et international ;
- permettre une interopérabilité entre les jeux et bases de données ;
- gérer les évolutions taxonomiques et nomenclaturales dans les données concernant ces espèces (suivi et gestion de la synonymie et de la hiérarchie taxonomique).

TAXREF est une pièce essentielle du dispositif d'information sur la nature en France, qui permet de communiquer tant au niveau des personnes que des ordinateurs grâce à l'utilisation de normes communes de références. Il permet la communication entre taxonomistes et utilisateurs de noms d'espèces (gestionnaires de données naturalistes, gestionnaires d'espaces naturels, écologues, généticiens, muséologues, enseignants et législateurs) et rend les bases de données interopérables.

Le référentiel doit permettre de répondre rapidement, par simple requête, à des questions telles que : combien y a-t-il d'espèces d'insectes en France, quelles sont les données qui concernent tel taxon, etc.

## A.II. Portée du référentiel

### A.II.1 Portée géographique

Le référentiel TAXREF couvre l'ensemble des organismes vivant en France :

- le territoire métropolitain ;
- les collectivités d'outre-mer : Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Îles Éparses, Réunion, Terres Australes, Terre Adélie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie Française, Clipperton.

Le référentiel couvre les milieux continentaux et marins.

Le référentiel inclus des espèces citées par erreur de ces territoires ainsi que des espèces non encore présentes mais pour lesquelles une surveillance est mise en place (cas des espèces envahissantes).

### A.II.2 Portée taxonomique

La portée taxonomique du référentiel s'étend sur l'ensemble du domaine vivant, avec en priorité les plantes, les animaux et les champignons.

### A.II.3 Portée temporelle

Le référentiel TAXREF prend en compte l'ensemble des êtres vivants actuels et ceux qui constituent l'histoire naturelle proche, c'est-à-dire depuis le paléolithique. On y trouvera ainsi le mammoth ou l'ours de caverne.

## A.III. Périmètre du référentiel

TAXREF est un **référentiel des espèces sauvages**. Les taxons domestiques ou cultivés (races ou cultivars) ne sont a priori pas traités, sauf si la gestion de certaines données l'exige ou qu'on les trouve dans le milieu naturel. Quoiqu'il en soit, l'exhaustivité n'est pas recherchée, à la différence des espèces sauvages.

La priorité du référentiel est de mettre à disposition autant de noms scientifiques que possible, en attendant de pouvoir prétendre à l'exhaustivité, sachant que la complétude de l'information reste hétérogène selon les groupes et les espaces géographiques, en fonction de l'expertise disponible (handicap taxonomique).

## A.IV. Coordination et consolidation, rôle du MNHN

De nombreuses listes de référence existent déjà selon les groupes taxonomiques et les différents territoires métropolitains ou ultramarins, souvent avec une expertise taxonomique et nomenclaturale variable. Il s'agit donc de coordonner l'ensemble de ces connaissances et de faire valoir les compétences locales dans une science globale. Cette coordination implique une **consolidation nationale**, exprimant la nécessité d'utiliser un seul et même nom pour une espèce, qu'il s'agisse de la Martinique, la Réunion ou la Polynésie française. Cette réconciliation est notamment indispensable dans le contexte des espèces exotiques envahissantes. Dans la mesure de l'existant, cette consolidation est portée au niveau mondial par l'utilisation de Global Species Database en liens uniques (voir C.II).

Le rôle du Muséum est donc :

- d'assurer la synthèse, la coordination et la consolidation nationale, régionale ou globale du référentiel ;
- de produire de nouveaux référentiels lorsque ceux-ci n'existent pas ;

- d'assurer la diffusion du référentiel, notamment au travers du SINP, vers l'ensemble de la communauté.

## B. Gestion des noms scientifiques

### B.I. Principes généraux

TAXREF est un référentiel taxonomique et nomenclatural. Il fournit une liste de noms scientifiques valides et leurs synonymes reflétant les connaissances taxonomiques à un temps donné. Seuls les noms disponibles au sens des codes de nomenclature entrent dans le cadre de TAXREF :

- pour les animaux : code de nomenclature zoologique (ICZN<sup>4</sup>) ;
- pour les algues, les champignons et les plantes : code de nomenclature des algues, de la fonge et des plantes (ICBN<sup>5</sup>) ;
- pour les bactéries : code de nomenclature des bactéries<sup>6</sup>.

TAXREF n'est pas un espace de publication : aucune combinaison nouvelle, c'est-à-dire non publiée, n'y est établie.

En conséquence, TAXREF refuse (liste non exhaustive) :

- les groupes dits fonctionnels, c'est-à-dire des groupes pratiques pour identifier un ensemble d'espèces mais pas nécessairement clairement définis taxonomiquement et non publiés valablement (par exemple « papillons de nuit » ou « petits poissons »). Ces groupes doivent être gérés aux niveaux des données et non dans le référentiel taxonomique lui-même. Seuls les groupes qui ont fait l'objet d'une publication peuvent être intégrés à TAXREF (par exemple la section *Ruderalia* Kirschner, H. Øllg. et Stepanek, définie dans le genre *Taraxacum*).
- les noms comportant des mentions telles que « sp. », « cf. », « aff. », « prox. », « ? », etc. qui sont liés à des problèmes d'identification et doivent être gérés au niveau des données et non au niveau du référentiel.
- les noms « *sensu* », c'est-à-dire les noms utilisés dans un sens autre que celui de l'auteur du taxon, ne peuvent pas être considérés comme de référence. En revanche, TAXREF peut prendre en compte les noms « *sensu* » qui sont synonymes d'un autre nom, à condition que les auteurs concernés soient clairement mentionnés et que la correspondance ait été établie par un spécialiste ayant une très bonne connaissance des usages au cours du temps.

Pour ces deux derniers points, il existe des exceptions discutées ou en cours de discussion.

### B.II. Pérennité des noms diffusés

Les noms scientifiques diffusés dans le référentiel TAXREF sont pérennes.

Les changements de nom d'autorité sont gérés par la création d'un nouvel enregistrement, à l'exception des cas suivants :

- ajout de l'auteur (et/ou de la date) lorsque celui-ci n'était pas renseigné dans les versions précédentes du référentiel ;
- ajout ou retrait des parenthèses à l'autorité (cas de la faune) ;

<sup>4</sup> <http://www.nhm.ac.uk/hosted-sites/iczn/code/>

<sup>5</sup> <http://www.iapt-taxon.org/nomen/>

<sup>6</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8817/>

- faute de frappe évidente par exemple « Hartret, 1921 » corrigé en « Hartert, 1921 » ;
- synonymie d'usage : afin de respecter la continuité des usages dans les jeux de données, il est possible de transformer l'autorité en « auct. non » suivi de l'auteur du nom valide, à condition que la synonymie d'usage s'applique à l'ensemble du champ géographique de TAXREF (France métropolitaine et d'outre-mer). Voir E.II

Le nom scientifique peut être exceptionnellement modifié dans le cas d'émendations orthographiques prévues par les codes de nomenclature. Toutefois, dans le cas où l'orthographe injustifiée est la plus utilisée, alors il y a création d'un nouvel enregistrement.

Par ailleurs, un enregistrement peut ne plus être diffusé dans TAXREF : il s'agit de cas exceptionnels, lorsqu'il s'avère qu'un nom n'est rattachable à aucun autre nom du référentiel (ou si jamais l'enregistrement correspond à un doublon d'un autre enregistrement). Ces noms sont alors retirés de la diffusion mais restent dans la table de travail (table TAXREF). De cette façon, il reste possible de ré-inclure ultérieurement ces noms dans la diffusion si cela s'avère justifié. Par la suite, ils pourront être supprimés, mais toute déletion d'un nom de la table TAXREF s'accompagne de la copie de ce nom dans une table de structure similaire : aucun nom n'est jamais vraiment effacé (voir J. Cas des enregistrements (CD\_NOM) qui disparaissent).

En aucun cas ces rares changements ne doivent induire une quelconque ambiguïté taxonomique.

### **B.III. Règles pour la création de nouveaux noms**

Le référentiel TAXREF a pour but de lister les noms de taxons figurant dans la littérature taxonomique. Les noms non corrects mais qui sont malgré tout couramment utilisés et qui figurent dans une publication de référence ou un texte officiel (par exemple un texte juridique) sont acceptés dans le référentiel, par exemple :

- *Gymnophthalmus pleei* est couramment utilisé alors que le nom correct est *Gymnophthalmus pleii*. Ces deux noms figurent dans TAXREF, le premier étant rattaché au deuxième.

- *Potimirim glabra* (Müller, 1881) est mentionné à tort dans une publication scientifique. Ce nom est intégré à TAXREF et rattaché à *Potimirim glabra* (Kingsley, 1878) qui est l'autorité correcte.

Malgré tout, la liste des taxons de TAXREF est contrainte par l'utilisation des référentiels sources et les règles des codes de nomenclature.

### **B.IV. Recommandations nomenclaturales**

Dans le cas où plusieurs solutions nomenclaturales sont autorisées par ces codes, TAXREF applique les recommandations suivantes :

#### **NOM SCIENTIFIQUE**

Le nom de l'espèce doit suivre la nomenclature binominale : l'écriture sans le sous-genre entre parenthèses est considérée par défaut comme le nom de référence. Des exceptions peuvent apparaître dans TAXREF en raison de la liaison avec WoRMS qui ne suit pas toujours cette règle.

Pour les rangs infra-spécifiques, la nomenclature trinominale est adoptée :

- dans le cas de la flore, avec indication systématique du rang (« subsp. » pour les sous-espèces, « var. » pour les variétés, « f. » pour les formes) entre l'épithète spécifique et

le nom terminal (voir article [24.1](#) (ICBN)), par exemple : *Euphorbia flavicoma* subsp. *costeana*.

- dans le cas de la faune, sans aucun ajout pour les sous-espèces (ex : *Acmaeodera bipunctata obenbergeriana*); avec indication du rang dans les autres cas (*Ascidia sydneyensis* var. *samea*).

#### CITATION DES AUTEURS

- S'il y a 2 auteurs, ils sont séparés par une esperluette (signe '&') encadrée d'espaces, par exemple : Linden & André (cf. Recommandation [46C1](#) (ICBN)).
- les synonymies d'usage sont notées sous la forme « auct. non » suivi de l'auteur du nom valide (e.g. *Crocodilurus lacertinus* auct. non (Daudin, 1802) ou *Alchemilla hybrida* auct. non L. (recommandation 50D (ICBN)). « auct. » peut être remplacé par « sensu » suivi du nom de l'auteur employant le nom à tort.

Pour les algues, champignons et plantes :

- TAXREF adopte la recommandation [46A](#) du Code qui préconise l'utilisation des abréviations standardisées de Brummitt & Powell (1992)<sup>7</sup> pour les noms d'auteurs (travail d'homogénéisation des abréviations en cours pour l'ensemble du référentiel). En conséquence, un même auteur peut apparaître sous deux orthographes différentes s'il s'agit d'un nom de plante ou d'animal (cas de Carl Reinhold Sahlberg : « C. R. Sahlberg » en zoologie et « Sahlb. » en botanique).
- TAXREF suit rigoureusement l'IPNI et ne met aucun espace dans les abréviations d'auteur, que ce soit entre l'initiale(s) et le nom ou dans l'abréviation du nom, par exemple :  
Écrire « W.D.J.Koch » et non « W. D. J. Koch » ;  
Écrire « Balf.f. » et non « Balf. f. ».

Pour les animaux :

- s'il existe plusieurs auteurs portant le même nom, le plus ancien s'écrit sans initiale et les suivants s'écrivent avec les initiales afin d'éviter toute homonymie d'auteur. Dans ce cas, il faut mettre un espace uniquement entre la dernière initiale et le nom (pas d'espace entre les initiales). De nombreux cas sont encore à traiter dans TAXREF.
- par ailleurs, « Linnaeus » est utilisé pour Linné, Fuessly préférentiellement à Fuesslin et Füssli, et Motschulsky préférentiellement à Motschoulsky. Les caractères diacritiques sont respectés au maximum (Strøm utilisé plutôt que Ström). Cette liste est complétée au fur et à mesure de la découverte de cas litigieux.

## C. Sources de l'information

### C.I. Sources utilisées

Trois types de sources sont utilisés pour alimenter TAXREF :

- des bases de données validées et officielles (WoRMS, FishBase, Fauna Europaea, BDNFF, base Nadeaud, etc.) ;

<sup>7</sup> Brummitt, R. K. & Powell, C. E. 1992. *Authors of plant names: a list of authors of scientific names of plants*. Royal Botanic Gardens, Kew London, 732 pp.

- des publications scientifiques ;
- les données de groupes d'experts : Société Herpétologique de France, Société Française d'Arachnologie, ONEMA, IFRECOR, etc.

Une attention particulière est portée aux sources de données selon qu'elles représentent de l'expertise taxonomique ou une source pour l'occurrence des différents taxons sur les territoires concernés (« liste de référence » ou « checklist ») qui ne suit pas nécessairement la taxonomie et la nomenclature la plus à jour. En conséquence, une méthodologie est mise en place afin d'utiliser ces différentes sources dans le contexte de consolidation nationale.

Une liste des principales sources de TAXREF est donnée en PARTIE 5.

## C.II. Global Species Database (GSD)

Les GSD sont des référentiels taxonomiques qui traitent d'un groupe taxonomique dans sa globalité, ce qui est l'objectif même de la taxonomie. Ce sont des sources de données *a priori* fiables, puisque ce sont les taxonomistes spécialistes du groupe eux-mêmes qui assurent la consolidation à l'échelle mondiale. En conséquence, **TAXREF favorise l'utilisation de référentiels mondiaux (GSD) et participe à leur amélioration.**

Les GSD sont logiquement prioritaires sur les référentiels régionaux (RSD, Regional Species Database) ou locaux (LSD, Local Species Database). Néanmoins, il est évident que les référentiels locaux évoluent généralement plus rapidement que les GSD. En conséquence, la méthodologie TAXREF vise à faire remonter les informations nouvelles du niveau local au niveau mondial.




Figure 3: Interaction entre TAXREF et les référentiels existants (GSD : Global species database ; RSD : Regional species database).

Lorsqu'une base mondiale (GSD) existe pour un groupe taxonomique donné et qu'elle est suffisamment à jour et avancée pour être reconnue par la communauté scientifique, TAXREF l'utilise donc prioritairement comme source (Figure 3, flèche 1). La procédure consiste alors à **identifier les taxons présents en France**. Des extractions de la GSD sont effectuées et une correspondance unique (lien 1-1) est établie entre les identifiants de la GSD et les identifiants de TAXREF (CD\_NOM), ce qui assure une équivalence stricte entre les deux bases. TAXREF utilise à l'heure actuelle plusieurs GSD, notamment Algaebase ou le World Register of Marine Species (WoRMS).

Si pour un groupe taxonomique donné il n'y a pas de GSD mais qu'il existe en revanche une RSD, alors celle-ci est utilisée comme source et mise à profit de la même façon qu'une GSD. TAXREF utilise par exemple Fauna Europaea (faune continentale d'Europe).

Si pour un groupe donné, il existe une GSD et une RSD (e.g. WoRMS (World Register of Marine Species) et ERMS (European Register of Marine Species)), c'est naturellement la GSD qui a priorité.

Enfin, si une GSD ou une RSD n'est pas reconnue par la communauté scientifique parce qu'elle ne s'appuie pas sur un réseau d'experts suffisants et pratique une logique de compilation sans contrôle de noms existants ou sans références aux codes de nomenclatures internationaux, alors elle n'est pas utilisée.

### **C.III. Consolidations nationale et internationale**

Au niveau local, TAXREF intègre des listes validées et publiées qui ne couvrent qu'une partie du territoire français (« listes de référence », Figure 3, flèche 2). La problématique consiste alors à trouver un consensus entre les différentes sources lorsque des désaccords existent : c'est le travail de consolidation nationale, qui est effectué en concertation avec les experts taxonomistes des groupes et territoires concernés.

#### **C.III.1 Cas des listes de taxons liés à une GSD**

Dans le cas où la liste de référence traite d'un groupe dont il existe une GSD, elle est mise en correspondance avec celle-ci (Figure 4). Cette comparaison entre le niveau local (listes de référence) et le niveau global (GSD) est doublement bénéfique :

- d'un côté, la liste de référence permet de repérer les manques ou les erreurs de la GSD qui en est alors informée (Figure 3, flèche 3);
- de l'autre côté la GSD, grâce à sa conception globale du groupe taxonomique, apporte la cohérence nécessaire entre les différentes listes de référence (Figure 3, flèche 4).

Dans le cas de données nouvelles, il est possible de disposer des nouveaux noms immédiatement sans attendre le retour de la GSD, à condition que ce nom désigne une espèce nouvellement décrite qu'il est normal de ne pas trouver dans la GSD (ou une espèce récemment arrivée sur le territoire dans le cas de l'utilisation de RSD).

Dans le cas où la GSD refuse de corriger ou d'ajouter le nom dans sa base :

- soit le refus est justifié d'un point de vue nomenclatural / taxonomique, auquel cas ce nom doit être reconsidéré au niveau de la liste de référence ;

- soit il s'agit d'un nom qui est hors cadre méthodologique de la GSD (type de synonyme qui n'est pas pris en compte dans la GSD par exemple). Si ce nom entre dans la méthodologie de TAXREF, alors il y sera intégré.

Quoi qu'il en soit, toute différence entre TAXREF et la GSD utilisée doit être justifiée par des références bibliographiques au sein même de TAXREF.




Figure 4 : Méthodologie mise en place entre TAXREF et les Global Species Database (GSD). En gris : référentiels taxonomiques ou « checklists » ; cerclé de rouge : ce qui concerne TAXREF.

### C.III.2 Cas des listes de taxons non liés à une GSD

Si la liste concerne un groupe taxonomique non encore traité dans TAXREF, elle est incluse telle quelle à condition qu'il s'agisse d'une liste publiée et reconnue comme référence pour le groupe en question (cas de la plupart des insectes d'Outre-mer par exemple).

Si la liste concerne un groupe taxonomique déjà traité dans TAXREF :

- soit la liste à intégrer est une version actualisée de la liste de TAXREF, auquel cas la mise à jour est effectuée (e.g. Catzeflis (2008) et Catzeflis (2011)) ;

- soit il s'agit d'une liste nouvelle pour TAXREF, auquel cas elle doit être comparée aux données déjà dans TAXREF (en portant attention aux dates de publication, certaines incohérences pouvant provenir de sources trop anciennes). En cas de désaccords entre les deux listes, il peut être nécessaire de contacter les experts taxonomistes du groupe pour décision.

#### **C.IV. Références bibliographiques**

En fonction du type d'ajouts ou de modifications effectués sur le référentiel, différentes ressources bibliographiques sont nécessaires pour TAXREF.

##### **C.IV.1 Pour ajout de noms scientifiques**

- Pour les espèces nouvelles : publication originale respectant les codes de nomenclature.

ex : Roux, C., Boulanger, M. & Malle, N. 2009. *Caloplaca itiana* sp. nov., espèce nouvelle de lichen du littoral de la Manche (France). *Bulletin de l'Association Française de Lichénologie*, 34(1): 1-10.

- Pour des changements de synonymie ou de classification : publication scientifique nécessaire.

ex : Ahrens, D. 2007. Taxonomic changes and an updated catalogue for the Palaearctic Sericini (Coleoptera : Scarabaeidae : Melolonthinae). *Zootaxa*, 1504: 1-51.

##### **C.IV.2 Pour ajout de noms vernaculaires**

Tout type de littérature peut être pris en compte, y compris les guides naturalistes ou les sites web spécialisés (ex : site [DORIS](#) sur la faune et de la flore subaquatiques de la Fédération française d'études et de sports sous-marins).

##### **C.IV.3 Pour occurrences nouvelles dans les territoires français**

- Pour les statuts biogéographiques (indigénat, introduction, endémisme, invasion, etc.) : publication scientifique nécessaire.

ex : Dusoulier, F., Lupoli, R., Aberlenc, H. P. & Streito, J.-C. 2007. L'invasion orientale de *Leptoglossus occidentalis* en France: bilan de son extension biogéographique en 2007 (Hemiptera: Coreidae). *L'Entomologiste*, 63(6): 303–308.

- Pour la présence / absence d'une espèce dans un territoire :

Tout type de littérature peut être pris en compte, y compris les nouvelles occurrences mentionnées sur des forums naturalistes, sous réserve que la détermination de l'espèce soit accompagnée d'une photo, de la date de détermination et du nom du déterminateur.

Dans ce cas, une référence bibliographique est créée avec l'url et une copie de la page web sous forme de zip contenant la page html et les photos associées (« page web complète »).

ex : <http://mersociety.wordpress.com/2012/11/07/extraordinarily-rare-whale-sighting-omuras-whale-balaenoptera-omurai/> référencé comme :

Krajewsky, H. 2012. Extraordinarily Rare Whale Sighting – Omura's Whale (*Balaenoptera omurai*). *Marine Education and Research Society Blog*. Posted on November 7, 2012, downloaded on May 5, 2014. <http://mersociety.wordpress.com/2012/11/07/extraordinarily-rare-whale-sighting-omuras-whale-balaenoptera-omurai/>

## **C.V. Choix de nouvelles sources**

Si pour un groupe taxonomique non traité dans TAXREF, il existe un référentiel reconnu par la communauté (publications récentes faisant référence, e.g. flores, monographies, articles scientifiques), alors il peut être intégré dans TAXREF.

S'il existe plusieurs référentiels qui se valent (cas des oiseaux), le ou les experts du groupe concerné sont consultés pour définir le référentiel à suivre, ou du moins pour discuter des choix à adopter en cas de divergence entre référentiels.

Si aucun référentiel n'existe, la consultation d'experts peut être l'occasion d'élaborer un nouveau référentiel.

Étant donné la grande portée du référentiel taxonomique, le choix de nouvelles sources pour TAXREF se fait en fonction de deux grands types de priorités, à savoir :

- apporter le support référentiel aux différents programmes ayant besoin de nommer les espèces : ZNIEFF, SIE-Sandre, inventaires nationaux, textes juridiques, listes rouges, etc. ;
- rester à l'écoute de l'actualité taxonomique, d'une part en assurant un suivi des publications majeures ou bien des listes de référence, d'autre part en jouant l'opportunité pour les groupes où des taxonomistes se déclarent comme collaborateurs, ou bien pour les groupes où la connaissance disparaît qu'il est donc urgent de conserver.

Au-delà de ces priorités, le premier objectif reste la complétude du référentiel.

## **D. Biogéographie des taxons**

### **D.I. Logique référentielle et logique d'inventaire**

TAXREF est le référentiel taxonomique national : il liste l'ensemble des êtres vivants recensés sur le territoire et est donc directement lié à une logique d'inventaire. TAXREF gère la répartition des espèces via l'utilisation de statuts biogéographiques par territoire administratif ou biogéographique français. Ces statuts permettent d'avoir une vision synthétique de la répartition des espèces dans les différents territoires français. Ils permettent aussi d'estimer la proportion d'espèces indigènes par rapport aux espèces introduites, ou bien le nombre d'espèces endémiques ou éteintes et sont donc de bons indicateurs.

### **D.II. Notion de statuts biogéographiques**

Les statuts biogéographiques définis se veulent suffisamment généraux pour être transversaux à la faune, la flore et la fonge. Ils couvrent trois notions différentes : notion de présence (présence/absence), d'origine (indigénat ou introduction) et de surface d'aire d'occupation (endémisme).

## D.II.1 Définition des statuts biogéographiques

Tableau 1 : Définitions des statuts biogéographiques utilisés dans TAXREF (valeurs de la table TAXREF\_STATUTS).

STATUT	DESCRIPTION	DEFINITION
P	Présent (indigène ou indéterminé)	<p>Taxon présent au sens large dans la zone géographique considérée, c'est-à-dire taxon indigène ou taxon dont on ne sait pas s'il appartient à l'une des autres catégories. Le défaut de connaissance profite donc à l'indigénat.</p> <p>Par <b>indigène</b> on entend : taxon qui est issu de la zone géographique considérée et qui s'y est naturellement développé sans contribution humaine, ou taxon qui est arrivé là sans intervention humaine (intentionnelle ou non) à partir d'une zone dans laquelle il est indigène<sup>8</sup>. (NB : sont exclus les hybrides dont l'un des parents au moins est introduit dans la zone considérée) <u>Sont regroupés sous ce statut tous les taxons catégorisés « natif » ou « autochtone ».</u> Les taxons hivernant quelques mois de l'année entrent dans cette catégorie.</p>
E	Endémique	Taxon naturellement restreint à la zone géographique considérée.
S	Subendémique	<p>Taxon naturellement restreint à une zone non intégralement incluse dans la zone géographique considérée mais dont les principales populations se situent dans celle-ci (par ex distribution à cheval sur les Pyrénées françaises et espagnoles, sur les Jura français et suisse, endémique corso-sarde, etc.).</p> <p>Pour l'Outre-mer, on applique ce statut à l'endémisme régional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour la Guyane= endémique du plateau des Guyanes,</li> <li>- pour les Antilles françaises = endémique des petites Antilles, Trinidad et Tobago non incluses,</li> <li>- pour Mayotte = endémique de l'archipel des Comores,</li> <li>- pour la Réunion = endémique des Mascareignes,</li> <li>- pour les îles subantarctiques = endémique de la South Indian Ocean Province<sup>9</sup>.</li> <li>- pour Wallis et Futuna (WF) = endémique Fidji / WF ou endémique WF / Samoa / Tonga</li> <li>- pour la Polynésie française (PF) = endémique PF / Iles Cook</li> </ul>
C	Cryptogène	Taxon dont l'aire d'origine est inconnue et dont on ne peut donc pas dire s'il est indigène ou introduit <sup>10</sup> .
I	Introduit	<p>Taxon introduit (établi ou possiblement établi) dans la zone géographique considérée.</p> <p>Par <b>introduit</b> on entend : taxon dont la présence dans la zone géographique considérée est due à une intervention humaine, intentionnelle ou non, ou taxon qui est arrivé dans la zone sans intervention humaine mais à partir d'une zone dans laquelle il est introduit<sup>8</sup>.</p> <p>Par <b>établi</b> (terme pour la faune, = <b>naturalisé</b> pour la flore) on entend : taxon introduit qui forme des populations viables (se reproduisant) et durables qui</p>

<sup>8</sup> Pyšek, P., Richardson, D. M., Rejmánek, M., Webster, G. L., Williamson, M. & Kirschner, J. 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. *Taxon*, 53(1): 131-143.

<sup>9</sup> Marion et Prince Edward Islands, Heard et McDonald Islands, Iles Crozet et Kerguelen au sens de Lewis-Smith (1984), étendu aux Iles Saint-Paul et Amsterdam en raison de leur rattachement administratif aux TAAF [Lewis-Smith, R. I. 1984. Terrestrial plant biology. In: Laws, R.M. [Ed] *Antarctic Ecology*. Academic Press, London. 1: 61-162.].

<sup>10</sup> Carlton, J. T. 1996. Biological invasions and cryptogenic species. *Ecology*, 77(6): 1653-1655.

STATUT	DESCRIPTION	DEFINITION
		se maintiennent dans le milieu naturel sans besoin d'intervention humaine <sup>8</sup> .  <u>Sont regroupés sous ce statut tous les taxons catégorisés « naturalisé », « établi », et <i>a priori</i> ceux catégorisés « non-indigène », « exotique », « exogène », « allogène », « allochtone », « non-natif », (en anglais : <i>alien</i>) dans une publication scientifique, sous réserve qu'ils soient établis et non envahissants.</u>
J	Introduit envahissant	Taxon introduit dans la zone géographique considérée, qui produit des descendants fertiles souvent en grand nombre, et qui a le potentiel pour s'étendre de façon exponentielle sur une grande aire, augmentant ainsi rapidement son aire de répartition <sup>8</sup> . Cela induit souvent des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives (IUCN, 2000).  <u>Sont regroupés sous ce statut tous les taxons catégorisés « introduit envahissant », « exotique envahissant » ou « invasif » (<i>invasive</i> en anglais) dans une publication scientifique.</u>
M	Introduit non établi (dont domestique)	Taxon introduit qui peut occasionnellement se reproduire en dehors de son aire de culture ou de captivité, mais qui ne peut se maintenir à l'état sauvage car ne pouvant former de populations viables sans intervention humaine, et qui dépend donc d'introductions répétées pour se maintenir dans la nature <sup>8</sup>  <u>Sont regroupés sous ce statut tous les taxons catégorisés « introduit occasionnel », « subspontané », « échappé de culture ou de captivité » (en anglais : <i>casual alien</i>).</u> Ce statut inclut les taxons strictement domestiques (faune), cultivés (flore) ainsi que les espèces commercialisées (espèces d'aquariophilie par exemple).
B	Occasionnel	Taxon occasionnel, non nicheur, accidentel dans la zone géographique considérée (par exemple migrateur de passage).
D	Douteux	Taxon dont la présence dans la zone géographique considérée n'est pas avérée (en attente de confirmation).
A	Absent	Taxon non présent dans la zone géographique considérée.
W	Disparu	Taxon qui n'est plus présent à l'état sauvage dans la zone géographique considérée mais qui n'est pas globalement éteint. Rq : en cas de doute sur la présence ancienne ou non du taxon à l'état sauvage, utiliser le statut absent (A).
X	Éteint	Taxon globalement éteint (= ayant totalement disparu de la surface du globe terrestre).
Y	Introduit éteint / disparu	Taxon introduit naturalisé par le passé mais aujourd'hui disparu de la zone géographique considérée (W) ou éteint (X).
Z	Endémique éteint	Taxon endémique et aujourd'hui disparu, donc globalement éteint (X).
Q	Mentionné par erreur	Taxon mentionné par erreur comme présent sur le territoire considéré.

Ces notions sont contingentes à chacun des territoires administratifs de la France, à savoir :

- la métropole (continentale et Corse),
- la Guyane,
- la Martinique,
- la Guadeloupe et ses dépendances (Marie-Galante, l'archipel des Saintes et la Désirade),
- Saint-Martin,
- Saint-Barthélemy,
- Saint-Pierre-et-Miquelon,

- Mayotte,
- la Réunion,
- les îles Éparses,
- la Terre Adélie (nouveau v10.0),
- les îles subantarctiques (archipel des Kerguelen, archipel de Crozet, îles Saint-Paul et Amsterdam) (nouveau v10.0),
- les Terres Australes et Antarctiques Françaises (hors îles Éparses), calculé à partir de la Terre Adélie et des îles subantarctiques,
- la Nouvelle-Calédonie,
- Wallis-et-Futuna,
- la Polynésie Française,
- l'île de Clipperton.

**Ces territoires sont à considérer dans leur intégralité.** Ainsi, une espèce qui est indigène d'au moins un site du territoire considéré est à prendre en compte comme indigène du territoire entier, même si elle s'avère introduite dans d'autres sites de ce territoire.




Figure 5 : Localisation des territoires français couverts par TAXREF.

### D.II.2 Attribution des statuts biogéographiques

L'attribution des statuts biogéographiques aux taxons repose sur des publications scientifiques, et éventuellement sur les données d'experts dans le cadre de programmes nationaux (inventaires, listes rouges, etc.). La Figure 6 propose un diagramme pour l'attribution d'un statut biogéographique à un taxon. Ce diagramme se parcourt de haut en bas : chaque niveau parcouru permet d'attribuer un statut de plus en plus précis. Ainsi dans tous les cas où une espèce est présente sur le territoire considéré (statut P) mais qu'on peut caractériser cette présence (présence occasionnelle ou non), préciser l'origine du taxon (indigénat ou introduction) ou son endémisme, alors on le précise. En cas de doute entre deux statuts, il est plus judicieux de conserver le statut du niveau précédent sur le diagramme, voire de remonter au statut P (en cas de présence) ou au statut A (en cas d'absence), lesquels seront moins précis mais corrects.

Étant donné que TAXREF recherche l'**exhaustivité des espèces sauvages**, une espèce qui serait à la fois à l'état domestique/cultivé et à l'état sauvage est considérée comme une espèce sauvage. Ainsi, une espèce qui est à la fois cultivée et naturalisée dans le milieu naturel est considérée comme une espèce naturalisée (statut I). De même, il est plus important pour

TAXREF de savoir qu'une espèce est disparue à l'état sauvage (statut W) que de savoir qu'elle est toujours cultivée sur le territoire.




Figure 6: Diagramme pour l'attribution d'un statut biogéographique à un taxon (voir le Tableau 1 pour les définitions des statuts). En bleu : notion d'origine du taxon (indigénat ou introduction) ; en vert : notion de surface de l'aire d'occupation du taxon (endémisme).

### D.II.3 Synonymies et gestion des héritages

Lorsqu'un nom devient synonyme d'un autre, et lorsque ce nom possédait un statut pour un territoire donné, la transmission de ce statut vers le nouveau nom de référence n'est pas automatique, de façon à ne pas inclure d'erreurs éventuelles. Par contre, il existe des tests de contrôle pour repérer d'éventuelles incohérences dans les statuts d'occurrence.

## E. Structure du référentiel

Le référentiel se compose de 4 tables principales (voir Figure 7) :

- la table TAXREF qui constitue le référentiel *sensu stricto* (noms scientifiques) ;
- la table TAXVERN qui gère les noms vernaculaires ;
- la table CONTEXT qui référence les bases de données source utilisées dans le cadre de TAXREF et fait le lien vers celles-ci ;
- la table DOCS qui gère les références bibliographiques.

Les autres tables sont des tables explicatives (dictionnaires) ou des tables de correspondance.

### E.I. Structure de la table TAXREF

TAXREF est un référentiel unique regroupant plantes, champignons et animaux, métropole et outre-mer. Il n'est pas composé d'une multitude de référentiels juxtaposés.

En conséquence, la structure de l'information disponible doit être simple et souple pour répondre aux exigences de la taxonomie et de la nomenclature des êtres vivants. Afin de simplifier la complexité inhérente à l'exercice, le choix est le suivant :

- une seule table gère l'ensemble des noms scientifiques, les autres tables n'étant que des tables explicatives (dictionnaires) ;
- quel que soit leur rang taxonomique, tous les noms sont traités de façon équivalente (dans le même champ). Un autre champ contient le rang taxonomique.




Figure 7: Modèle de données TAXREF. La base documentaire est accessible sous forme de web-service (DOCS-Web). En orange : références ; en jaune : dictionnaires ; en gris : correspondances.

## E.I.1 Liste des champs

La liste des champs de la table TAXREF est fixée dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Liste des champs de la table TAXREF (en gras la clé unique).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
<b>CD_NOM</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique du nom scientifique</b>
CD_SUP	Entier long	Identifiant (CD_NOM) du taxon supérieur
CD_REF	Entier long	Identifiant (CD_NOM) du taxon de référence (nom retenu)
LB_NOM	Texte	Nom scientifique du taxon (sans l'autorité)
LB_AUTEUR	Texte	Autorité du taxon (Auteur, année, gestion des parenthèses)
NOM_COMPLET	Texte	Combinaison des champs pour donner le nom complet (~LB_NOM+" "+LB_AUTEUR)
RANG	Varchar2(4)	Rang taxonomique (clé vers TAXREF_RANG)
VALIDITE	Varchar2(4)	Type de validité du nom scientifique complet (clé vers TAXREF_VALIDITE)
HABITAT	Entier court	Code de l'habitat (clé vers TAXREF_HABITATS)
FR	Varchar2(1)	Statut biogéographique en France métropolitaine (clé vers TAXREF_STATUTS)
GF	Varchar2(1)	Statut biogéographique en Guyane (clé vers TAXREF_STATUTS)
MAR	Varchar2(1)	Statut biogéographique à la Martinique (clé vers TAXREF_STATUTS)
GUA	Varchar2(1)	Statut biogéographique à la Guadeloupe (clé vers TAXREF_STATUTS)
SM	Varchar2(1)	Statut biogéographique à Saint-Martin (clé vers TAXREF_STATUTS)
SB	Varchar2(1)	Statut biogéographique à Saint-Barthélemy (clé vers TAXREF_STATUTS)
SPM	Varchar2(1)	Statut biogéographique à Saint-Pierre et Miquelon (clé vers TAXREF_STATUTS)
MAY	Varchar2(1)	Statut biogéographique à Mayotte (clé vers TAXREF_STATUTS)
EPA	Varchar2(1)	Statut biogéographique aux Îles Éparses (clé vers TAXREF_STATUTS)
REU	Varchar2(1)	Statut biogéographique à la Réunion (clé vers TAXREF_STATUTS)
SA	Varchar2(1)	Statut biogéographique aux îles subantarctiques (clé vers TAXREF_STATUTS)
TA	Varchar2(1)	Statut biogéographique en Terre Adélie (clé vers TAXREF_STATUTS)
TAAF	Varchar2(1)	Statut biogéographique aux TAAF, calculé à partir des champs SA et TA (clé vers TAXREF_STATUTS)
PF	Varchar2(1)	Statut biogéographique en Polynésie française (clé vers TAXREF_STATUTS)
NC	Varchar2(1)	Statut biogéographique en Nouvelle-Calédonie (clé vers TAXREF_STATUTS)
WF	Varchar2(1)	Statut biogéographique à Wallis et Futuna (clé vers TAXREF_STATUTS)
CLI	Varchar2(1)	Statut biogéographique à Clipperton (clé vers TAXREF_STATUTS)
INPN	Booléen	Diffusion publique sur l'INPN (true/false)

Les valeurs prises par le champ RANG sont fixées par la table TAXREF\_RANG (Tableau 3).

Les valeurs prises par le champ VALIDITE sont fixées par la table TAXREF\_VALIDITE, non décrite ici car en construction.

Les valeurs prises par le champ HABITAT sont fixées par la table TAXREF\_HABITATS (Tableau 4).

Les valeurs prises par les champs FR, GF, MAR, GUA, SM, SB, SPM, MAY, EPA, REU, TAAF, SA, TA, PF, NC, WF et CLI sont fixées par la table TAXREF\_STATUTS (voir Tableau 1 page 19).




Figure 8 : Situation géographique des champs d'occurrence biogéographique.

Tableau 3: Valeurs de la table TAXREF\_RANG. L'ensemble des rangs disponibles sont dorénavant diffusés sur l'INPN. Les rangs en gris correspondent aux rangs pris en compte par le CD\_TAXSUP afin de disposer d'une classification simplifiée (**ajouts de la tribu et de la sous-famille depuis la version 11**).

RANG	DETAIL	RANG	DETAIL	RANG	DETAIL
Dumm	Domaine	OR	Ordre	AGES	Agrégat
SPRG	Super-Règne	SBOR	Sous-Ordre	ES	Espèce
KD	Règne	IFOR	Infra-Ordre	SSES	Sous-Espèce
SSRG	Sous-Règne	PVOR	Parv-Ordre	NAT	Natio
IFRG	Infra-Règne	SCO	Section	VAR	Variété
PH	Phylum/Embranchement	SSCO	Sous-Section	SVAR	Sous-Variété
SBPH	Sous-Phylum	SPFM	Super-Famille	FO	Forme
IFPH	Infra-Phylum	FM	Famille	SSFO	Sous-Forme
DV	Division	SBFM	Sous-Famille	RACE	Race
SBDV	Sous-Division	SPTR	Super-Tribu	CAR	Cultivar
SPCL	Super-Classe	TR	Tribu	AB	Abberatio
CLAD	Clade	SSTR	Sous-Tribu		
CL	Classe	GN	Genre		
SBCL	Sous-Classe	SSGN	Sous-Genre		
IFCL	Infra-Classe	SC	Section		
PVCL	Parv-Classe	SBSC	Sous-Section		
SPOR	Super-Ordre	SER	Série		
COH	Cohorte	SSER	Sous-Série		

Tableau 4 : Valeurs de la table TAXREF\_HABITATS.

HABITAT	DESCRIPTION	REMARQUES
1	Marin	Espèces effectuant l'intégralité de leur cycle de vie en milieu marin. Les espèces vivant en mer mais pouvant occasionnellement supporter les eaux douces entrent dans cette catégorie (exemple de la sardine).
2	Eau douce	Espèces effectuant l'intégralité de leur cycle de vie en eau douce. Les espèces vivant en eau douce mais pouvant occasionnellement supporter les eaux saumâtres entrent dans cette catégorie.
3	Terrestre	Espèces vivant uniquement en milieu terrestre.
4	Marin & Eau douce	Espèces pouvant être présentes en eau douce et en mer de par leur cycle de vie diadrome pour les organismes amphihalins, ou par tolérance aux fortes variations de salinités pour les organismes euryhalins.
5	Marin & Terrestre	Espèces effectuant une partie de leur cycle de vie en mer et l'autre partie à terre (cas des pinnipèdes, des tortues et des oiseaux marins par exemple).
6	Eau saumâtre	Espèces vivant exclusivement en eau saumâtre.
7	Continental (terrestre et/ou eau douce)	Espèces continentales (non marines) dont on ne sait pas si elles sont terrestres et/ou d'eau douce (taxons provenant de Fauna Europaea).
8	Continental (terrestre et eau douce)	Espèces terrestres effectuant une partie de leur cycle en eau douce (odonates par exemple), ou fortement liées au milieu aquatique (loutre par exemple).

### E.I.2 Clé primaire

L'idéal serait de faire une clé unique sur les champs LB\_NOM et LB\_AUTEUR. Les codes de nomenclature existent justement pour qu'il y ait une relation non ambiguë, de 1 à 1, entre un nom scientifique et une espèce biologique.

Or cela n'est possible car :

- TAXREF fait appel à deux codes de nomenclature distincts, celui de botanique et celui de zoologie, et qu'en conséquence des doublons sont possibles (et ils existent) ;
- il existe des problèmes nomenclaturaux d'homonymie non encore résolus par les systématiciens ;
- compte-tenu de l'existence de données, et de la nécessité de pouvoir réattribuer ces données à des entités biologiques évoluant au gré des travaux taxonomiques, il est parfois nécessaire de dupliquer un nom.

En conséquence, une clé primaire numérique a été créée : CD\_NOM.

Afin de coller au plus près du monde parfait où le nom scientifique serait la clé primaire, il est institué une pérennité du couple identifiant unique / nom scientifique.

Cette méthode de gestion représente un avantage considérable quant au suivi des modifications.

Rares exceptions : il existe quelques exceptions qui sont opérées afin que les changements nomenclaturaux n'affectent pas les concepts taxonomiques visés dans les données (voir B.II).

### E.I.3 Contraintes d'intégrité

Le champ CD\_REF ne doit pas être *null* et le champ CD\_SUP ne doit pas être *null* pour les taxons de référence. Ils doivent désigner un CD\_NOM qui existe (clé étrangère).

## E.II. Gestion de la synonymie

La gestion de la synonymie s'opère via le champ CD\_REF qui correspond au CD\_NOM du nom de référence. Si le taxon considéré fait référence, alors CD\_REF = CD\_NOM. Le CD\_REF doit correspondre à un taxon de référence (synonymie sur un niveau).

### E.II.1 Cas particulier de la synonymie d'usage

Compte tenu de l'objectif premier de TAXREF qui est la gestion de données, le lien entre CD\_NOM et CD\_REF peut amener à effectuer des changements relativement conséquents dans TAXREF du moment où l'on veut que le CD\_NOM continue de désigner la même entité biologique. Par exemple, le taxon que l'on désignait autrefois par *Lacerta viridis* (Laurenti, 1768) (CD\_NOM = 77686) s'est vu redistribué en plusieurs espèces, et toutes les populations françaises doivent être maintenant nommées *Lacerta bilineata* Daudin, 1802. En conséquence, et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un référentiel national, le CD\_NOM 77686 s'est vu réattribuer le nom *Lacerta viridis* auct. non (Laurenti, 1768) et renvoie vers *Lacerta bilineata*, tandis que *Lacerta viridis* (Laurenti, 1768) s'est vu réattribuer un nouveau CD\_NOM (non diffusé puisque non présent en France).

Cette gestion n'est plus possible dès lors que plusieurs espèces issues de la scission sont présentes sur le territoire, auquel cas le référentiel ne peut rien apporter : soit sa précision géographique est insuffisante, soit il faut de toute manière retourner au spécimen pour l'identification. Dans cette situation, on rajoute au référentiel les nouveaux noms et on laisse

le CD\_NOM préexistant dans son état. C'est notamment le cas des goujons (*Gobio* spp.) et des chabots (*Cottus* spp.) de métropole.

### E.III. Gestion de la classification

La gestion de la hiérarchie taxonomique s'opère via le champ CD\_SUP qui correspond au CD\_NOM du taxon parent (par exemple le genre ou le sous-genre pour l'espèce).

En toute logique, le CD\_SUP doit pointer vers un taxon de référence. Il existe quelques rares exceptions, comme le cas d'un genre qui tomberait dans la synonymie d'un autre mais pour lequel certaines espèces initialement classées dans ce genre n'auraient pas été révisées, qui conservent donc le même nom et pointent en conséquence vers un synonyme.

En toute logique également, le CD\_SUP d'une espèce devrait pointer vers le genre qui compose son nom (avec le sous-genre en intermédiaire ou non). Il existe encore quelques rares exceptions, comme par exemple des escargots du Pacifique décrits dans le genre « *Helix* » mais dont aucune nouvelle combinaison n'a pour l'instant été publiée. Dans ce cas, on fait pointer le CD\_SUP vers la famille à laquelle l'espèce se rattache, en l'occurrence les Charopidae, sans passer par le genre qui de toute évidence est faux.

### E.IV. Liens vers les bases de données sources

La table CONTEXT référence les bases de données source utilisées pour TAXREF et permet de faire le lien vers celles-ci (Tableau 5).

Tableau 5: Liste des champs de la table CONTEXT (en gras la clé unique).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
<b>CD_CT</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique de l'enregistrement</b>
CT_NAME	Texte	Acronyme de la base
CT_URL	Texte	Adresse internet (URL) de la base
CT_TYPE	Texte	Portée de la base (mondiale, régionale, locale)
CT_TITLE	Texte	Nom de la base
CT_AUTHORS	Texte	Auteurs de la base
URL_SP	Texte	URL pour accéder aux pages des taxons (à compléter avec l'identifiant du taxon)

Les tables CONTEXT et TAXREF sont liées via la table de correspondance CONTEXT\_TAXREF (Tableau 6) par un lien 1-n. Cette table permet de stocker l'identifiant unique du nom scientifique dans la base source. Chaque identifiant ne peut être attribué qu'une seule fois à un CD\_NOM de TAXREF (index unique), ce qui assure une **équivalence stricte entre TAXREF et la base source**.

Tableau 6 : Liste des champs de la table CONTEXT\_TAXREF (en gras la clé unique).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
<b>CD_CONTEXT_TAXREF</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique de l'enregistrement</b>
CD_NOM	Entier long	Identifiant unique du nom scientifique dans TAXREF (clé vers TAXREF)
CD_CT	Entier long	Identifiant unique de la base source (clé vers CONTEXT)
CT_SP_ID	Texte	Identifiant unique du nom scientifique dans la base source

## E.V. Références bibliographiques

La table DOCS constitue la base documentaire de l'INPN où sont stockées toutes les références bibliographiques utilisées dans le système d'information (Tableau 7).

Tableau 7 : Liste des principaux champs de la table DOCS (en gras la clé unique).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
<b>CD_DOC</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique de l'enregistrement</b>
CITATION	Texte	Citation du document (auteur(s) et année de publication)
REFERENCE	Texte	Référencement complet du document
URL	Texte	URL d'accès au document, de préférence un permalien
DIFFUSION	Booléen	Type de diffusion (aucune, limitée, publique)

Les références bibliographiques de TAXREF sont utilisées à différentes fins : description originale du nom, illustration originale, source de la nouvelle combinaison, source de la synonymie, statut biogéographique du taxon pour la métropole, pour la Guyane, etc. Ces différentes utilisations sont stockées dans la table DOCS\_USES, et appelées dans la table DOCS\_TAXREF qui lie les références bibliographiques aux noms de TAXREF (Tableau 8).

Tableau 8 : Liste des champs de la table DOCS\_TAXREF (en gras la clé unique).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
<b>CD_DOC_TAXREF</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique de l'enregistrement</b>
CD_NOM	Entier long	Identifiant unique du nom scientifique (clé vers TAXREF)
CD_DOC	Entier long	Identifiant unique de la référence bibliographique (clé vers DOCS)
CD_DOCUSE	Entier long	Utilisation qui est faite de la référence (clé vers DOCS_USES)
PAGE	Entier court	Page où le nom scientifique apparaît
URL_PAGE	Texte	URL de la page où le nom scientifique apparaît

## E.VI. Noms vernaculaires

### E.VI.1 Structure de la table TAXVERN

Tableau 9 : Liste des champs de la table TAXVERN (en gras la clé unique).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
<b>CD_VERN</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique de l'enregistrement</b>
CD_NOM	Entier long	Identifiant unique du nom scientifique (clé vers TAXREF)
CD_REF	Entier long	Identifiant (CD_NOM) du taxon de référence (nom retenu)
NOM_VERN	Texte	Nom(s) vernaculaire(s) du taxon
ISO639-3	Texte	Code de la langue dans la norme internationale ISO 639-3 (clé vers LANGUAGES_ISO639-3)
PAYS	Texte	Pays d'utilisation de l'enregistrement
CD_DOC	Entier long	Identifiant unique de la référence bibliographique (clé vers DOCS)
NOM_CITE	Texte	Nom scientifique associé au(x) nom(s) vernaculaire(s)
COMPTE	Entier court	Nombre de noms vernaculaires de l'enregistrement (champ calculé)

La table TAXVERN (Tableau 9) permet la gestion des noms vernaculaires dans différentes langues **et dialectes (nouveau version 12)**, l'objectif étant le français, l'anglais ainsi que l'ensemble des langues et dialectes locaux parlés dans les différents territoires français. Ces

langues suivent la norme internationale ISO 639-3 qui établit des codes à 3 lettres pour l'ensemble des langues vivantes, mortes et anciennes ([http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/language\\_codes.htm](http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/language_codes.htm)). **Pour la v12, 71 langues et dialectes différents** sont utilisés pour traduire les noms vernaculaires au sein du territoire français.

Un pays d'utilisation est associé à la langue, ce qui permet de gérer les noms locaux. Ainsi, TAXVERN permet de distinguer le fait que le nom français pour *Ficus nymphaeifolia* est « Figuiers grande feuille » à la Guadeloupe et « Figuiers blanc » à la Martinique.

Le champ NOM\_VERN peut contenir plusieurs noms vernaculaires (séparés par des virgules). Le premier nom vernaculaire de la liste est considéré comme le nom de référence pour la langue donnée. Les noms vernaculaires ne doivent pas être précédés d'un déterminant (à mettre entre parenthèses après le nom si nécessaire). Dans le cas où il existe un nom vernaculaire spécifique pour le mâle et la femelle, il est précisé entre parenthèses après le nom (exemple de *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) : « Cerf-volant (mâle), Biche (femelle) »).

### **E.VI.2 Gestion des héritages de noms vernaculaires**

Lorsqu'un nom devient synonyme d'un autre, et lorsque ce nom possédait un(des) nom(s) vernaculaire(s), la transmission de ce(s) nom(s) vernaculaire(s) vers le nouveau nom de référence n'est pas automatique, de façon à ne pas inclure d'erreurs éventuelles. Par contre, il existe des tests de contrôle pour repérer d'éventuelles incohérences dans les noms vernaculaires.

## **F. Gestion du référentiel**

### **F.I. Historique et suivi des modifications**

Toutes les modifications effectuées sur le référentiel (tables TAXREF et TAXVERN) sont enregistrées dans une table d'audit au travers de déclencheurs informatiques avec les informations suivantes (Figure 9):

- le nom de la table et du champ concernés (TABLE\_NAME et COLUMN\_NAME)
- l'ancienne valeur du champ (OLD)
- sa nouvelle valeur (NEW)
- par qui et quand la modification a été effectuée (ID\_UTILISATEUR et DATE)
- pour quel CD\_NOM de TAXREF.




Figure 9 : Modèle de données de TAXREF : schéma du suivi des modifications.

## F.II. Gestion des ressources bibliographiques (DOCS-Web)

Tous les ajouts ou modifications effectués sur le référentiel (tables TAXREF et TAXVERN) sont, dans la mesure du possible, justifiés par des ressources bibliographiques. Ces ressources sont stockées et gérées dans la base documentaire de l'INPN (tables DOCS, Figure 7), accessible à travers l'application DOCS-Web (<http://inpn.mnhn.fr/docs-web>) laquelle permet en outre le partage des ressources (Figure 10).

DOCS-WEB > Rechercher | Tout lister | API démo INPN

**Dierkens, M. & Ramage, T. 2016. Deuxième contribution à la connaissance des araignées de Polynésie française. Bilan des espèces présentes et description de *Theridion charlati* n. sp. et *Glenognatha ledouxi* n. sp. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 85(3-4): 134-172.**

Citation abrégée      Dierkens & Ramage (2016)  
 Année                      2016

---

CD\_DOC                      162489

[créé le 20 sept. 2016 12:06:27 par Ramage Thibault]  
 [modifié le par ]

Figure 10 : Référence bibliographique dans DOCS-Web.

L'implémentation du flux RSS de Web of Knowledge (Thomson Reuters) au niveau de DOCS-web permet un contrôle des connaissances et une intégration aux grandes bases de données internationales (Figure 11).




Figure 11 : Flux RSS de Web of Knowledge mis en oeuvre dans DOCS-Web.

### F.III. Application TAXREF-Web

TAXREF est issu de la collaboration entre de nombreux scientifiques, qu'il faut faire travailler sur un seul et même objet, la table référentielle. À cette fin, une application Web a été mise en ligne afin que chaque expert en taxonomie travaille et bénéficie du travail des autres experts en temps réel (Figure 12).

L'accès à cette application est strictement réglementé et se fait par identification avec mot de passe. Chaque expert possède un domaine d'expertise identifié par un taxon et tous ses descendants. Ainsi, un spécialiste des papillons de Guyane aura accès à l'ensemble des papillons de TAXREF, ceci dans le souci du respect de la consolidation nationale.

Afin de faciliter les échanges entre experts, une fonctionnalité « Email » permet dorénavant de générer automatiquement un email pré-rempli avec le nom du taxon consulté dans TAXREF-web, les liens vers les différentes bases source concernées et de le destiner à l'ensemble des experts / coordinateurs de ces bases conjointement pour discussion (nouveau v10.0).

TAXREF Outils admin TAXREFMATCH Références Statuts tercerie

**Taxref-Web**

**Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., 1834** 128357 depuis v2.0

TAXREF Notes Localité-Typologie Historique Utilisation INPN Photos Fiche INPN

Biota > Plantae > Viridaeplantae > Magnoliophyta > Equisetopsida > Magnoliidae > Rosanae > Fabales > Fabaceae > Vachellia >

**NOMS VERNACULAIRES**

Acacia odorant	Français	fra	Antilles françaises	[Editer]
Mimosa de Farnèse, Cassie, Cassier, Mimosa de Farnesie	Français	fra	France	[Editer]
Fomgo tamotamo	Bushi [= Shibushi]	buc	Mayotte	[Editer]
Acacia de Farnèse, Cassie, Cassier	Français	fra	Mayotte	[Editer]
Mugu m'nsinzano	Maore Comorian [= Mahorais]	zwb	Mayotte	[Editer]
Zépinard	Créole réunionnais	caf	Réunion	[Editer]
Acacia de Farnèse, Cassie, Cassie jaune, Cassier, Épinard, Moza, Z'épinard	Français	fra	Réunion	[Editer]

**PROGRAMMES**

BDTFX : 70511 [Editer]

BDNGM : 10708 [Editer]

GRIN : 450067 [Editer]

ITR : 9989 [Editer]

ITE : 9989 [Editer]

Euro+Med Plantbase : EA6EAB3-516C-4599-9280-FA4DE83C877B Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. [Editer]

TROPICOS : 13045544 [Editer]

Get WORMS Aphaid

**DETAILS** Envoyer

Nom: Vachella farnesiana

Autorité: (L.) Wight & Arn., 1834 [ANNEE = 1834]

Nom de référence: 128357 Choisir Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., 1834

Validité: NR - Nom de référence

Parent direct: 639349 Choisir Vachellia Wight & Arn., 1834

Habitat / Milieu: 3 - Terrestre

INPN: true

ORIGIN\_CREA:

BIBLIO: Prodr. Fl. Ind. Orient., 1 : 272

Protologue:

Rang: ES - Espèce

Has child: false, Has SYN: false

**OCCURENCES ET STATUTS BIOGEOGRAPHIQUES** Envoyer

France métropolitaine (FR)	I - Introduit
Guyane française (GF)	P - Présent (indigène ou indéterminé)
Martinique (MAR)	P - Présent (indigène ou indéterminé)
Guadeloupe (GUA)	P - Présent (indigène ou indéterminé)
Saint-Martin (SM)	A - Absent
Saint-Barthélemy (SB)	P - Présent (indigène ou indéterminé)
Saint-Pierre et Miquelon (SPM)	
Mayotte (MAY)	I - Introduit
Réunion (REU)	J - Introduit envahissant
Îles éparses (EPA)	M - Introduit non établi (dont cultivé ou domestique)
TAAF	
Îles subantarctiques (SA)	
Terre Adélie (TA)	
Nouvelle-Calédonie (NC)	J - Introduit envahissant
Wallis et Futuna (WF)	
Polynésie française (PF)	J - Introduit envahissant
Clipperton (CLI)	

**SYNONYMES** : 6 nom(s)

CD_NOM	Validité
161825 <i>Mimosa farnesiana</i> L., 1753	BA valid me
97970 <i>Farnesia odora</i> Gasp., 1763	SY valid me
79693 <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd., 1806	SY valid me
707274 <i>Mimosa indica</i> Poir., 1811	SY valid me
707275 <i>Acacia indica</i> (Poir.) Desv., 1814	SY valid me
161826 <i>Papouax farnesiana</i> (L.) Raf., 1838	SY valid me

Boîte à outils

Ajouter un enfant

Ajouter un synonyme

Dupliquer le taxon

Jouer tous les contrôles

Effacer ce nom

Email

Placer dans l'arbre taxo

INPN

Fuzzy match me

Données sous CardObs

Rendre dispo dans CardObs

Données collection MNHN

Biodiversity Library

Google (LB\_NOM)

Google (Doris)

Google (ruthenica)

Google (special [Missing])

Google (NOM\_COMPLET)

Scholar (LB\_NOM)

Scholar (NOM\_COMPLET)

Figure 12 : Détails d'un taxon dans TAXREF-Web (onglet principal « TAXREF »).

Le suivi des modifications est visible dans l'application : pour chaque nom du référentiel, un historique complet est fourni (date de création du nom, par qui, quelles modifications y ont été apportées, quand, etc.). Chaque expert peut ainsi suivre les changements réalisés par les autres experts travaillant sur TAXREF-Web, et éventuellement l'invalider (Figure 13).

**Taxref-Web** 264492 depuis v5.0

**Camponotus maculatus** (Fabricius, 1781)

TAXREF | Notes | Historique | Photos | fiche INPN

**HISTORIQUE**  
Création le 2005-05-09 par (Gargominy Olivier) Webmestre\_INPN

Modification par	Date	Table	Champs	Valeur initiale	Valeur finale	
Webmestre_INPN (Gargominy Olivier)	2012-04-30	TAXREF	LB_AUTEUR	(Fabricius, 1782)	(Fabricius, 1781)	Défaire
Webmestre_INPN (Gargominy Olivier)	2012-04-30	TAXREF	ANNEE	1782	1781	Défaire
Webmestre_INPN (Gargominy Olivier)	2012-04-30	TAXREF	REU	I		Défaire
Webmestre_INPN (Gargominy Olivier)	2012-04-30	TAXREF	MAY	P		Défaire
Webmestre_INPN (Gargominy Olivier)	2012-04-30	TAXREF	EPA	P		Défaire
Ramage Thibault	2012-05-02	TAXREF	INPN	false	true	Défaire
TERCERIE Sandrine	2014-10-09	TAXREF	HABITAT	7	3	Défaire

Boîte à outils

- [Ajouter un enfant](#)
- [Ajouter un synonyme](#)
- [Dupliquer le taxon](#)
- [Placer dans l'arbre taxo](#)
- [Lien vers l'INPN](#)
- [Fuzzy match me](#)
- [Rendre dispo dans CardObs](#)
- [Biodiversity Library](#)
- [Google \(LB\\_NOM\)](#)
- [Google \(NOM\\_COMPLET\)](#)
- [Scholar \(LB\\_NOM\)](#)
- [Scholar \(NOM\\_COMPLET\)](#)

Figure 13 : Historique et suivi des modifications dans TAXREF-Web (onglet « Historique »).

TAXREF-Web permet également d'associer des références bibliographiques à chaque nom du référentiel, en indiquant l'utilisation qui est faite de chaque référence (description originale du nom, source de la synonymie, source pour le statut biogéographique à Mayotte, etc.) (Figure 14). L'ajout de notes, associées ou non à une référence bibliographique, permet d'apporter des informations complémentaires et de justifier les choix adoptés dans TAXREF.

**Taxref-Web** 445272 depuis v3.0

**Nesoropupa duodecim** Gargominy, 2008

TAXREF | Notes | Historique | Photos | fiche INPN

**BIBLIO**

- [Gargominy \(2008\) : 520 \[description originale\]](#) [Editer](#)
- [Gargominy \(2008\) : fig. 1A, 2B, 3C-D, 4A, 4E, 5C-D & 7 \[Illustration originale\]](#) [Editer](#)

**NOTES**

- Distribution : Société : Tahiti  
Références : [Gargominy \(2008\)](#) [Editer](#) [Références](#)
- Matériel type : [MNHN 2000-9934](#) [Editer](#) [Références](#)
- Statut biogéographique : Endémique insulaire [Editer](#) [Références](#)

Figure 14 : Notes et gestion des ressources bibliographiques dans TAXREF-Web (onglet « Notes »).

#### **F.IV. Contrôles effectués sur le référentiel**

Plus de 200 contrôles sont effectués de façon à assurer la cohérence et l'intégrité du référentiel : écriture correcte des noms scientifiques par rapport aux codes de nomenclature, respect de la logique de la classification, recherche de combinaisons génériques non décelées, etc.

Ces contrôles sont effectués à la volée lors de la création ou la modification de noms dans TAXREF-Web, mais ils font surtout partie d'un travail spécifique avant chaque nouvelle version.

Mettant en évidence certains problèmes nomenclaturaux non encore résolus par les systématiciens, ils ne peuvent pas tous recevoir un traitement définitif dans TAXREF.

# PARTIE 2 : DIFFUSION

## G. Téléchargement

---

Le référentiel taxonomique TAXREF est publié sur le site de l'INPN en libre accès. Il est disponible intégralement depuis la version 2.0.

<https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo>

L'utilisateur a le choix entre :

- le téléchargement du référentiel intégral, sous forme de fichier texte zippé ;
- le téléchargement de parties du référentiel avec la possibilité de filtrer taxonomiquement (par embranchement, classe, ordre ou famille), géographiquement (métropole, chacune des collectivités d'outre-mer) ou écologiquement (marin, continental).

Le fichier archive Zip comporte huit fichiers :

- TAXREFv15.txt (UTF-8), le référentiel en lui-même (657 609 lignes),
- TAXVERNv15.txt (UTF-8), le référentiel des noms vernaculaires (63 849 lignes),
- TAXREF\_CHANGES.txt (UTF-8), tableau décrivant l'ensemble des modifications depuis la version précédente (164 616 lignes),
- TAXREF\_LIENS.txt (UTF-8), tableau permettant un lien unique vers les bases de données sources (1 793 161 lignes),
- CDNOM\_DISPARUS.xls, tableau listant les CD\_NOM de niveau spécifique anciennement diffusés mais qui ne le sont plus dans la dernière version, avec les causes de leur disparition ou les CD\_NOM de remplacement dans le cas des doublons (9726 lignes).
- trois fichiers (UTF-8) habitats\_note.csv, rangs\_note.csv et statuts\_note.csv qui permettent d'interpréter respectivement la colonne Habitat, la colonne Rang et les colonnes de statuts biogéographiques dans les territoires (FR, GF, etc.).

## H. Structure du référentiel diffusé

Le référentiel TAXREF tel qu'il est diffusé (fichier TAXREFvXX.txt) est décrit dans le Tableau 10. Il reprend la table de travail telle que décrite précédemment (voir E.I) avec les conditions suivantes :

- INPN = 'true' (filtre des taxons français<sup>11</sup>) ;
- Les noms vernaculaires français et anglais sont regroupés dans la table référentielle ;
- Le champ CD\_TAXSUP propose une classification supérieure simplifiée aux rangs suivants : règne, embranchement, classe, ordre, famille, sous-famille et tribu. Le CD\_TAXSUP est une valeur calculée à partir du CD\_SUP. De cette façon, l'utilisateur a le choix d'utiliser une classification complète ou simplifiée.

Par ailleurs, afin d'avoir une lisibilité plus grande et des temps de requête plus courts, la classification supérieure est mise à plat dans les champs correspondants.

Tableau 10 : Liste des champs de la table TAXREF diffusée (en gras la clé unique).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
REGNE	Texte	Règne auquel le taxon appartient
PHYLUM	Texte	Embranchement auquel le taxon appartient
CLASSE	Texte	Classe à laquelle le taxon appartient
ORDRE	Texte	Ordre auquel le taxon appartient
FAMILLE	Texte	Famille à laquelle le taxon appartient
SOUS_FAMILLE	Texte	Sous-famille à laquelle le taxon appartient
TRIBU	Texte	Tribu à laquelle le taxon appartient
GROUP1_INPN	Texte	Regroupement vernaculaire (niveau 1)
GROUP2_INPN	Texte	Regroupement vernaculaire (niveau 2)
GROUP3_INPN	Texte	Regroupement vernaculaire (niveau 3)
<b>CD_NOM</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique du nom scientifique</b>
CD_TAXSUP	Entier long	Identifiant (CD_NOM) du taxon supérieur calculé dans la classification simplifiée (voir Tableau 3 pour les valeurs de rangs pris en compte)
CD_SUP	Entier long	Identifiant (CD_NOM) du taxon directement supérieur
CD_REF	Entier long	Identifiant (CD_NOM) du taxon de référence (nom retenu)
RANG	Texte	Rang taxonomique (lien vers TAXREF_RANG)
LB_NOM	Texte	Nom scientifique du taxon (sans l'autorité)
LB_AUTEUR	Texte	Autorité du taxon (Auteur, année, gestion des parenthèses)
NOM_COMPLET	Texte	Combinaison des champs précédents pour donner le nom complet (~LB_NOM+" "+LB_AUTEUR)
NOM_COMPLET_HTML	Texte	NOM_COMPLET avec balises HTML pour gérer les italiques dans le nom
NOM_VALIDE	Texte	Le NOM_COMPLET du CD_REF
NOM_VERN	Texte	Noms vernaculaires français
NOM_VERN_ENG	Texte	Noms vernaculaires anglais
HABITAT	Entier court	Code de l'habitat (clé vers TAXREF_HABITATS)
FR	Texte	Statut biogéographique en France métropolitaine (clé vers TAXREF_STATUTS)
GF	Texte	Statut biogéographique en Guyane (clé vers TAXREF_STATUTS)
MAR	Texte	Statut biogéographique à la Martinique (clé vers TAXREF_STATUTS)

<sup>11</sup> Quelques espèces non présentes en France sont diffusées ; il s'agit d'espèces potentiellement envahissantes, présentes en pays frontaliers mais pas encore en France, qui demandent une surveillance.

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
GUA	Texte	Statut biogéographique à la Guadeloupe (clé vers TAXREF_STATUTS)
SM	Texte	Statut biogéographique à Saint-Martin (clé vers TAXREF_STATUTS)
SB	Texte	Statut biogéographique à Saint-Barthélemy (clé vers TAXREF_STATUTS)
SPM	Texte	Statut biogéographique à Saint-Pierre et Miquelon (clé vers TAXREF_STATUTS)
MAY	Texte	Statut biogéographique à Mayotte (clé vers TAXREF_STATUTS)
EPA	Texte	Statut biogéographique aux Îles Éparses (clé vers TAXREF_STATUTS)
REU	Texte	Statut biogéographique à la Réunion (clé vers TAXREF_STATUTS)
SA	Texte	Statut biogéographique aux îles subantarctiques (clé vers TAXREF_STATUTS)
TA	Texte	Statut biogéographique en Terre Adélie (clé vers TAXREF_STATUTS)
TAAF	Texte	Statut biogéographique aux TAAF, calculé à partir des champs SA et TA (clé vers TAXREF_STATUTS)
PF	Texte	Statut biogéographique en Polynésie française (clé vers TAXREF_STATUTS)
NC	Texte	Statut biogéographique en Nouvelle-Calédonie (clé vers TAXREF_STATUTS)
WF	Texte	Statut biogéographique à Wallis et Futuna (clé vers TAXREF_STATUTS)
CLI	Texte	Statut biogéographique à Clipperton (clé vers TAXREF_STATUTS)
URL	Texte	Permalien INPN = 'https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/' + CD_NOM

L'ensemble des noms vernaculaires associés à TAXREF sont disponibles dans le fichier TAXVERNvXX.txt dans le format décrit Tableau 11.

Tableau 11: Liste des champs de la table TAXVERN diffusée (en gras la clé primaire).

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
<b>CD_VERN</b>	<b>Entier long</b>	<b>Identifiant unique de l'enregistrement dans TAXVERN</b>
CD_NOM	Entier long	Identifiant unique du nom scientifique (clé vers TAXREF)
LB_VERN	Texte	Liste de noms vernaculaires du taxon
NOM_VERN_SOURCE	Texte	Référence bibliographique associée à l'enregistrement (contient quelques balises html pour gérer les italiques)
LANGUE	Texte	Langue de l'enregistrement
ISO639_3	Texte	Code de la langue dans la norme internationale ISO 639-3 (clé vers LANGUAGES_ISO639-3)
PAYS	Texte	Pays d'utilisation de l'enregistrement

La correspondance entre les identifiants de TAXREF (CD\_NOM) et les identifiants des bases externes est diffusée via le fichier TAXREF\_LIENS.txt dans le format décrit Tableau 12.

Tableau 12: Liste des champs de la table TAXREF\_LIENS diffusée.

NOM	TYPE	COMMENTAIRES
CT_NAME	Texte	Acronyme de la base source
CT_URL	Texte	Adresse internet (URL) de la base source
CT_TYPE	Texte	Portée de la base source (mondiale (GSD), régionale (RSD), locale (LSD))
CT_TITLE	Texte	Nom de la base source
CT_AUTHORS	Texte	Auteurs de la base source
CD_NOM	Entier long	Identifiant unique du nom scientifique dans TAXREF
CT_SP_ID	Entier long	Identifiant unique du nom scientifique dans la base source
URL_SP	Texte	URL pour accéder aux pages des taxons dans la base source (facultatif)

## I. Modifications depuis la version précédente

Une table détaillant les ajouts, retraits et modifications opérés entre une version et sa précédente est également fournie. Sa structure est détaillée dans le Tableau 13.

**Les modifications sont fournies pour l'ensemble des noms diffusés, y compris la classification supérieure. Le champ CD\_SUP (diffusé depuis la version 9.0) et les champs SA et TA (diffusés depuis la version 10.0) sont également pris en compte dans cette table.**

Tableau 13 : Liste des champs de la table TAXREF\_CHANGES

NOM	COMMENTAIRES
CD_NOM	Code du nom (numéro de la ligne auquel le changement s'applique)
NUM_VERSION_INIT	Numéro de la version initiale
NUM_VERSION_FINAL	Numéro de la version finale
CHAMP	Champ auquel le changement s'applique
VALEUR_INIT	Valeur initiale du champ
VALEUR_FINAL	Valeur finale du champ
TYPE_CHANGE	Type du changement effectué ; peut prendre 3 valeurs {AJOUT, RETRAIT, MODIFICATION}

## J. Cas des enregistrements (CD\_NOM) qui disparaissent

Il est possible qu'un CD\_NOM diffusé dans une version ne le soit plus ultérieurement. Si ce phénomène peut poser des problèmes d'intégrité des données, il s'agit cependant d'un mal nécessaire ; les raisons de non-diffusion sont regroupées en trois catégories :

**Cas n°1.** Doublons orthographiques, combinaisons erronées qui proviennent principalement d'erreurs lors de la consolidation de listes locales. Pour les doublons, il est jugé nécessaire de ne plus diffuser ces noms afin de ne pas surcharger le référentiel, notamment pour les opérations de réconciliation. Dans ce cas, le CD\_NOM est à supprimer définitivement et un CD\_NOM de remplacement est proposé.

**Cas n°2.** Taxons diffusés à tort, ne respectant pas la méthodologie TAXREF (non présent et jamais signalé de France par exemple). Le CD\_NOM est toujours potentiellement valable et peut éventuellement être rediffusé dans une version à venir.

**Cas n°3.** Noms ambigus dont le contenu taxonomique est indéfini. Il peut s'agir de *nomen nudum* ou *nomen dubium* au sens des codes de nomenclature, mais également d'erreurs faites lors de la constitution du référentiel TAXREF. Aucune solution ne peut être proposée, le CD\_NOM est à supprimer définitivement et il faut retourner à la donnée.

L'ensemble de ces enregistrements est livré sous la forme d'une table CDNOMS\_DISPARUS (Tableau 14) dépendant de la version en cours.

Tableau 14: Liste des champs de la table CDNOM\_DISPAREUS.

NOM	COMMENTAIRES
CD_NOM	Identifiant unique du nom scientifique dans TAXREF
PLUS_RECENTE_DIFFUSION	Numéro de la dernière version dans laquelle le CD_NOM a été diffusé
CDNOM_REMPLACEMENT	CD_NOM de remplacement pour les cas de doublons supprimés
CD_RAISON_SUPPRESSION	Code de la raison de suppression ; peut prendre 3 valeurs (voir les 3 cas ci-dessus)
RAISON_SUPPRESSION	Raison de la suppression ; peut prendre 3 valeurs (voir les 3 cas ci-dessus)

## K. Référentiel en ligne sur l'INPN

### LA VERSION UTILISÉE EN LIGNE SUR L'INPN CORRESPOND À LA VERSION EN COURS DIFFUSÉE DANS LES PAGES DE TÉLÉCHARGEMENT.

Les références bibliographiques associées aux taxons spécifiques et infra-spécifiques sont disponibles sur l'INPN au niveau des fiches espèces, dans l'onglet « Taxonomie ».

Il est prévu de publier une nouvelle version par an minimum.

## L. API

Depuis la v12, TAXREF est désormais également accessible via un web-service dont la documentation est disponible ici : <https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/api/doc>.

Cette API regroupe les informations provenant du référentiel national **TAXREF** et de la **Base de connaissance sur les espèces** qui lui est associée. L'API fournit des réponses sur la nomenclature, la taxonomie, la répartition, les statuts (protections, menaces, etc) et les interactions biologiques entre espèces. Elle permet également d'accéder à l'ensemble des sources bibliographiques utilisées dans le cadre de TAXREF et de l'INPN. Cette API est **restful** autant que possible. Elle exprime les réponses au format **HAL (JSON Hypertext Application Language, <https://tools.ietf.org/html/draft-kelly-json-hal-08>)**.

## M. Historique des différentes versions de TAXREF diffusées

Voir Tableau 15 page suivante.

Par « espèces endémiques », on entend les espèces endémiques au sens large, c'est-à-dire espèces endémiques ou subendémiques (statuts E et S).

Par « espèces introduites », on entend les espèces introduites établies/naturalisées, y compris les envahissantes (statuts I et J). Les espèces introduites non établies (statut M) ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Les notions d'« espèces marines » et d'« espèces continentales » s'entendent au sens large (voir définitions précises dans la PARTIE 4 : ÉTAT D'AVANCEMENT).

Tableau 15: Récapitulatif des différentes versions de TAXREF diffusées. Noms d'espèces et d'infra = ensemble des noms de niveau spécifique, qu'il s'agisse de noms de références ou de synonymes ; Espèces et infra = espèces ou infra biologiques, c'est-à-dire uniquement les noms de référence. Les notions d'espèces marines / continentales suivent les définitions données dans le paragraphe O.IV Continental / Marin.

VERSION	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
Date de diffusion	15/02/08	20/09/10	12/10/11	18/07/12	08/04/13	19/11/13	01/12/14	02/12/15
Nombre total de noms	191 335	26 1213	315 225	337 858	387 163	407 137	452 106	485 189
Classification supra-spécifique	0	27 856	31 925	34 992	37 921	40 460	45 758	54 092
Noms d'espèces et d'infra	191 335	233 357	283 300	302 866	349 242	366 677	406 348	431 097
Espèces et infra	87 426	106 481	117 150	125 751	138 027	144 073	168 699	176 220
Espèces	77 405	93 969	103 809	112 235	123 407	130 572	153 576	160 612
Espèces endémiques	2429	4764	4954	5690	8796	9859	13 325	15 364
Espèces introduites	1885	2455	3147	3337	3709	4879	5276	5482
Espèces sauvages actuelles								
Espèces éteintes								
Espèces marines	na	13532	21015	23598	27892	30552	32619	34517
Espèces continentales	na	80 428	83 998	89 375	96 756	100 917	122 101	127 237
<b>METROPOLE</b>								
Noms d'espèces et d'infra	184 626	213 563	239 343	242 752	263 461	268 494	272 996	290 253
Espèces et infra	81 277	90 697	93 550	94 327	97 159	97 609	98 731	100 572
Espèces	71 449	79 059	81 120	82 090	84 509	86 200	87 325	88 922
Espèces endémiques	1958	2019	2048	2260	2300	2319	2357	2653
Espèces introduites	1770	1779	2179	2191	2191	2533	2588	2625
Espèces sauvages actuelles								
Espèces éteintes								
Espèces marines	na	6547	8468	9494	9622	9967	10 357	11 036
Espèces continentales	na	72 336	73 409	72 955	75 634	76 675	77 610	78 513
<b>OUTRE-MER</b>								
Noms d'espèces et d'infra	7579	26 109	56 621	73 503	105 166	124 237	163 928	175435
Espèces et infra	5023	16 150	25 786	33 138	43 194	50 249	74 392	80 723
Espèces	4833	15 269	24 823	31 922	41 306	48 002	70 458	76 521
Espèces (hors Guyane)	2520	12 547	20 448	27 160	36 404	42 725	48 596	53 418
Espèces endémiques	400	2626	2723	3168	6137	7540	10 968	12 711
Espèces endémiques (hors Guyane)	208	2433	2531	2976	5949	7308	9646	11 282
Espèces introduites	129	741	1127	1319	1763	2680	3046	3232
Espèces sauvages actuelles								
Espèces éteintes								
Espèces marines	na	6001	13 010	14 597	19 000	21 612	23 485	24 874
Espèces continentales	na	9516	12 349	17 808	22 896	26 972	47 618	52 319
<b>REFERENCES</b>								
Nombre de références	0	0	0	984	1706	2820	5154	7312
Nombre de données	0	0	0	54 653	110 934	142 485	186 855	218 042
Nombre de CD_NOM liés à une référence	0	0	0	48 905	88 432	101 949	131 829	154 340
Nombre de CD_REF liés à une référence	0	0	0	27 394	54 485	65 810	84 011	104 473
<b>PROGRAMMES</b>								
Nombre de programmes liés à TAXREF	nd	nd	nd	5	6	7	16	31
Nombre de liens programmes diffusés	nd	nd	nd	178 302	215 995	232 185	259 174	463 471
<b>NOMS VERNACULAIRES</b>								
Nombre total de noms vernaculaires	nd							
Nombre de noms vernaculaires français	nd							
Nombre de noms vernaculaires anglais	nd							

<b>VERSION</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Date de diffusion	03/11/16	07/12/17	23/10/18	06/12/19	15/12/20	16/12/21
Nombre total de noms	509 148	550 843	570 623	595 373	630 298	657 609
Classification supra-spécifique	57 987	62 553	65 220	68 110	72 762	76 214
Noms d'espèces et d'infra	451 161	488 290	505 403	527 263	557 536	581 395
Espèces et infra	182 498	195 405	199 939	204 001	211 337	216 419
Espèces	166 238	178 345	182 854	186 883	194 480	199 880
Espèces endémiques	16 773	17 947	19 424	20 293	21 234	21 646
Espèces introduites	5720	5867	6009	6185	6023	6150
Espèces sauvages actuelles		171 519	175 785	179 573	186 607	192 047
Espèces éteintes		355	344	344	350	352
Espèces marines	36108	37134	38332	39 571	43 283	46 382
Espèces continentales	131 392	142 358	145 792	148 730	152 768	155 187
<b>METROPOLE</b>						
Noms d'espèces et d'infra	297 910	323 118	329 858	339 623	359 043	372 698
Espèces et infra	101 167	111 584	112 820	114 518	117 987	119 835
Espèces	89 351	99 084	100 409	102 120	105 969	108 151
Espèces endémiques	2814	3056	3160	3251	3388	3432
Espèces introduites	2776	2787	2868	2989	2388	2426
Espèces sauvages actuelles		94 371	95 582	97 094	100 435	102 703
Espèces éteintes		101	84	81	80	80
Espèces marines	10 827	10 989	11 236	12 069	14 237	15 330
Espèces continentales	78 637	88 702	89 837	90 771	92 568	93 745
<b>OUTRE-MER</b>						
Noms d'espèces et d'infra	189737	199 662	211 843	224 994	237 576	249 957
Espèces et infra	86 845	89 683	93 320	96 028	100 207	103 690
Espèces	82 132	84 846	88 358	91 011	95 060	98 534
Espèces (hors Guyane)	58 229	60 509	63 973	65 800	68 825	71 695
Espèces endémiques	13 959	14 891	16 264	17 042	17 846	18 214
Espèces endémiques (hors Guyane)	12 451	12 900	14 035	14 626	15 295	15 639
Espèces introduites	3337	3503	3577	3644	4084	4184
Espèces sauvages actuelles		81 963	85 238	87 819	91 783	95 188
Espèces éteintes		254	260	263	270	272
Espèces marines	26 675	27 697	28 688	29 247	30 921	33 023
Espèces continentales	55 816	57 884	60 475	62 689	65 092	66 508
<b>REFERENCES</b>						
Nombre de références bibliographiques	9421	11 989	14 058	18 183	23 102	31 033
Nombre de données bibliographiques	253 138	291 270	317 875	375 519	429 703	478 851
Nombre de CD_NOM liés à une référence bibliographique	173 382	190 810	204 152	236 964	262 421	283 454
Nombre de CD_REF liés à une référence bibliographique	115 646	125 587	135 120	155 745	170 596	182 787
<b>PROGRAMMES</b>						
Nombre de programmes liés à TAXREF	34	35	35	43	65	67
Nombre de liens programmes diffusés	517 353	598 435	623 894	1 377 520	1 525 663	1 792 948
<b>NOMS VERNACULAIRES</b>						
Nombre total de noms vernaculaires	48 183	53 168	56 990	57 848	58 143	63 833
Nombre de noms vernaculaires français	29 333	31 842	32 615	33 324	33 499	39 156
Nombre de noms vernaculaires anglais	13 904	14 417	15 117	15 257	15 332	15 344




Figure 15: Évolution du nombre de noms (CD\_NOM) disponibles dans TAXREF.




Figure 16: Évolution du nombre d'espèces disponibles dans TAXREF, respectivement pour la métropole (en orange) et l'outre-mer (en bleu).




Figure 17: Évolution du nombre d'espèces endémiques disponibles dans TAXREF, respectivement pour la métropole (en orange) et l'outre-mer (en bleu).




Figure 18: Nombre de noms (CD\_NOM, en bleu) ou de taxons (CD\_REF, en orange) respectivement liés à une référence bibliographique.



# PARTIE 3 : UTILISATION

## N. Utilisation du référentiel dans la gestion de données

### N.I. Principes généraux

Le référentiel TAXREF est notamment conçu pour gérer l'évolution du statut taxonomique ou nomenclatural d'un nom dans les jeux de données. Afin que les mises à jour des différentes versions soient le plus facile possible, il faut que les gestionnaires de données prévoient l'architecture de leur base de façon à autoriser le remplacement complet d'une version du référentiel par une autre version plus récente. Il pourra alors être nécessaire de créer une table d'indexation des noms entre les jeux de données et TAXREF, afin d'éviter toute modification de la table TAXREF d'origine.

Un CD\_NOM qui a été transmis une fois n'est jamais effacé. Par contre, il se peut que des noms diffusés dans une version antérieure de TAXREF ne le soient plus, suite à une impossibilité de lier ce nom à une espèce biologique. De tels cas sont rares et l'utilisateur pourra discuter de ces points particuliers en prenant contact avec l'équipe TAXREF, soit par mail ([taxref@mnhn.fr](mailto:taxref@mnhn.fr)), soit sur la page dédiée du site de l'INPN <https://inpn.mnhn.fr/contact/contacteznous> (Thématique : "Espèces, [Référentiel taxonomique](#)").

En ce qui concerne le stockage du nom d'espèce, il est hautement recommandé de :

- 1) stocker la chaîne de caractère exacte à l'origine de la donnée
- 2) stocker le CD\_NOM
- 3) stocker le CD\_REF

En effet, le couple CD\_NOM / CD\_REF étant évolutif au cours de l'évolution de la taxonomie et des référentiels qui s'en font l'écho, il est indispensable de conserver la signification taxonomique du CD\_NOM (le CD\_REF qui, par construction désigne un nom de référence) au moment où il a été saisi.

Il est également possible de stocker la version de TAXREF sous laquelle la donnée a été saisie.

### N.I.1 Possibilité de gestion multi-référentielle

Compte tenu du fait que TAXREF est en liaison unique avec d'autres référentiels, préférentiellement des GSD (WoRMS, FishBase, AlgaeBase, etc.), tout jeu de données géré avec ce référentiel est directement transposable en références sous TAXREF (Figure 19).




Figure 19: Possibilité de gestion multi-référentielle dans TAXREF.

### N.II. Suivi des modifications

Lors de la mise à jour du référentiel, celui-ci gère automatiquement les changements taxonomiques pour peu que l'on opère les traitements sur le CD\_REF.

Il peut cependant s'avérer indispensable de contrôler les changements entre le CD\_REF stocké dans la table de données et la nouvelle version de TAXREF. À cette fin, chaque version du référentiel est livrée avec une table des changements opérés par rapport aux versions précédentes.

Le cas du « splittage » (scission) d'un taxon (l'espèce *Aa* est reconnue comme deux espèces distinctes *Aa* et *Ab*) doit retenir l'attention des gestionnaires de données, car ce cas n'est pas entièrement soluble via un référentiel taxonomique (voir E.II Gestion de la synonymie) : il faut réattribuer le bon nom aux spécimens identifiés, c'est-à-dire pour certains cas retourner dans la collection !

## O. Recherche de correspondance (réconciliation)

Dans le cas où les noms d'espèces concernées par le jeu de données ne sont liés à aucun référentiel avec lequel il existe un rapport 1 à 1 avec TAXREF (WoRMS, AlgaeBase, BDTFX, etc.), il est nécessaire que le gestionnaire des données établisse une correspondance (réconciliation) entre le nom utilisé dans TAXREF et le nom utilisé dans son jeu de données.

## **O.I. Directives**

La gestion des taxons dans une table de données est délicate : elle définit un lien entre une détermination par un individu X à un temps T, avec un nom dans un référentiel taxonomique établi à un temps T. En conséquence, la première recommandation consiste à rester au plus proche de l'auteur de la détermination (seul lui sait ce qu'il a voulu dire) et de stocker l'information selon les quelques directives suivantes :

- se procurer le plus d'informations possibles sur le nom utilisé : famille ou autre groupe parent, autorité, synonymie éventuelle ;
- établir la correspondance sur le maximum de champs possible : en plus du nom avec le LB\_NOM, le nom d'auteur (LB\_AUTEUR) est souvent indispensable pour séparer des synonymes ou des homonymes et tout groupe taxonomique supérieur doit être pris en compte (famille, ordre, classe, etc.) ;
- bien vérifier l'écriture des noms dans les tables de données. Avant toute correction à effectuer, dupliquer le champ du nom dans la table de données afin d'en conserver l'origine exacte (voir paragraphe suivant).

## **O.II. Pièges**

Les erreurs suivantes doivent être rigoureusement évitées :

- une correspondance sur le genre uniquement : en nomenclature binominale ou trinominale, le nom cité le plus à droite est le plus précis pour désigner l'entité biologique que l'on observe ;
- une correspondance sur le nom d'espèce (deuxième partie du binom) sans disposer de la famille et de l'autorité : les homonymes de ce type sont légions.

## **O.III. Outil de réconciliation TAXREF\_MATCH**

L'outil TAXREF\_MATCH a pour but d'aider à la mise en correspondance de listes taxonomiques avec TAXREF (réconciliation) ; il est accessible en ligne sur la plateforme TAXREF-web. Il permet le chargement de fichiers aux formats csv ou txt et retourne les résultats par mail.

<https://taxref.mnhn.fr/taxref-match>

## **O.IV. Stockage des informations dans les tables de données**

Un nom d'espèce attaché à une donnée (observation ou collection) résulte d'une détermination d'un spécimen faite par un individu X à un temps T. Il est donc fortement recommandé de stocker ces deux informations. On peut être amené à stocker plus d'informations pour préciser l'identification (guide ou référence bibliographique utilisée) soit par ligne de donnée, soit en métadonnées rapportées au jeu de données.



# PARTIE 4 : ÉTAT D'AVANCEMENT

## **P. Matériel et méthodes**

---

Les bilans suivants représentent une estimation de la biodiversité dans les territoires ainsi qu'une analyse des lacunes et un guide de l'effort à investir. Ils sont présentés pour chacune des quatre dernières versions de TAXREF (10.0, 11.0, 12.0 et 13.0) afin de pouvoir en suivre l'évolution.

### **P.I. Taxons terminaux**

Les taxons terminaux représentant les plus petites entités taxonomiques connues sur un territoire donné, on choisit cette unité pour illustrer soit la richesse biologique de la zone soit l'effort de collecte des noms au sein de TAXREF. Les chiffres représentent le nombre de taxons terminaux valides, indigènes et introduits, pour le groupe et la zone géographique donnés. Les taxons terminaux sont considérés relativement au territoire, c'est-à-dire qu'une espèce pourra être terminale sur un territoire et non terminale sur un autre si elle y est représentée par une sous-espèce.

### **P.II. Couverture géographique**

Les zones géographiques évaluées sont celles de TAXREF (voir D.II.1, Figure 5).

### **P.III. Statut biogéographique**

Les statuts biogéographiques considérés pour la présence sur un territoire sont : P, E, S, B, C, I, J, W, X, Z (voir Tableau 1). Etant donné que le référentiel contient des espèces signalées autrefois par erreur (statut Q), le total peut donc être supérieur au total des espèces présentes sur les territoires.

### **P.IV. Continental / Marin**

Les résultats sont présentés en distinguant les milieux continental et marin.

Le milieu marin correspond aux valeurs suivantes du champ « Habitat » de TAXREF (voir Tableau 4) :

- 1 : Marin
- 4 : Marin et eau douce
- 5 : Marin et terrestre
- 6 : Eau saumâtre

Le milieu continental correspond aux valeurs suivantes du champ « Habitat » de TAXREF (voir Tableau 4) :

- 2 : Eau douce
- 3 : Terrestre
- 4 : Marin et eau douce
- 5 : Marin et terrestre
- 7 : Continental (terrestre et/ou eau douce)
- 8 : Continental (terrestre et eau douce)

Les taxons dont le code « habitat » est 4 ou 5 sont donc comptabilisés dans chacun des deux tableaux continental et marin.

### **P.V. Groupes taxonomiques**

Le découpage des groupes est un assemblage pratique, principalement systématique mais aussi fonctionnel (tous les poissons sont regroupés), avec des niveaux de détails peu homogènes. Afin de minimiser ces disparités, un tableau est présenté spécifiquement pour les insectes en suivant les ordres.

Certains groupes peu diversifiés ne sont pas représentés.

Rq : dans la version 7.0, les algues vertes étaient restreintes aux seuls Chlorophyceae ; elles sont étendues aux Chlorophyta et aux Charophyta depuis la version 8.0.

### **P.VI. Complétude**

La couleur représente une fourchette de complétude par rapport au nombre de taxons estimés connus pour ce même groupe et cette même zone.

- Vert : TAXREF recense plus de 75% des taxons ;
- Jaune : entre 50 et 75% ;
- Orange : entre 25 et 50% ;
- Rouge : moins de 25%.

Cette estimation repose donc sur une estimation nécessairement approximative de la diversité des groupes pour chaque zone biogéographique, mais basée sur des publications scientifiques

(voir notamment Gargominy & Bocquet, 2013<sup>12</sup>). Il s'agit d'une **estimation non calculée, proposée ici pour simple valeur indicative.**

Le rouge représente les groupes pour lesquels TAXREF n'a pas fourni de travail spécifique, éventuellement de manière anecdotique. Le vert représente les groupes relativement bien traités, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des manques et qu'un suivi taxonomique régulier soit nécessaire.

## Q. Résultats

Les tableaux 16 à 19 présentent les résultats pour les taxons terminaux continentaux pour les ~~v11-v12~~ à ~~v14-v15~~ respectivement.

Les tableaux 20 à 23 détaillent ces résultats pour les insectes au niveau des ordres pour les ~~v11-v12~~ à ~~v14-v15~~ respectivement.

Les tableaux 24 à 27 présentent les résultats pour le milieu marin pour les ~~v11-v12~~ à ~~v14-v15~~ respectivement.

Pour chacune de ces présentations, certains petits groupes en termes de nombre d'espèces ont été omis.

Compte tenu des disparités en termes de nombres de taxons, certains groupes bien traités n'apparaissent pas en vert en raison de leur inclusion dans des groupes plus vastes sur lesquels il reste beaucoup de lacunes. Par exemple, les longicornes des Petites Antilles, exhaustivement traités, sont inclus dans les Coléoptères ; de même, les Décapodes sont globalement bien couverts mais il manque généralement d'autres groupes (Ostracodes etc.) pour compléter ce qu'on appelle communément les Crustacés.

---

<sup>12</sup> Gargominy, O. & Bocquet, A. 2013. *Biodiversité d'Outre-mer*. UICN France, Paris et éditions Roger Le Guen - PANACOCO, Beaumont-de-Lomagne: 360 pp.

## Q.I. Milieu continental

Tableau 16 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v12 : milieu continental

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	
Animaux	Arthropodes	Arachnides	5373	3501	599	199	102	36	34	5	32	149	1	59	539	13	366	8	
		Crustacés	1281	1001	40	35	29	18	12	2	28	26	10	16	106	34	85	7	
		Entognathes	1187	926	4	59	33	1	1	5	4	9		41		124	1	34	
		Insectes	71001	40228	16930	2950	1194	327	370	592	717	2903	150	102	0	5481	155	2552	28
		Myriapodes	669	540	4	39	13	7	5		1	8		2		63		22	
	Bryozoaires	13	13																
	Chordés	Amphibiens	193	50	122	7	7	3	4	1	2	2	0	0	0	2	1	1	0
		Mammifères	507	222	198	26	21	22	15	15	14	18	6	11	6	24	10	13	2
		Oiseaux	1996	659	808	289	229	140	115	328	128	133	57	101	19	225	46	171	41
		Poissons	820	120	449	37	46	6	19	8	54	70	13	8	0	150	36	66	3
		Reptiles	519	65	172	58	34	26	22	3	26	30	15	0	0	124	15	20	3
	Cnidaires	Hydrozoaires	10	9		1	1												
	Mollusques	Gastrotriches	52	53	1														
		Bivalves	50	45	6	3	3	1					0	0	0		0	0	
		Gastéropodes	1990	737	94	89	87	54	25	5	91	117	4	3		338	12	607	2
		Onychophores	4	0	1	1				0									
		Porifères	10	6			1									2			
		Rotifères	402	390										34					
		Tardigrades	71	67										3					
	Vers	Acanthocéphales	12	10															
		Annélides	458	375	22	20	4				1		8		39				
		Nématodes	534	481	2								3		41	1	1		
		Némertes	3	2														1	
		Plathelminthes	617	578	3	4	4	2	1	0	2	3	0	3	1	20	1	5	0
	Bactéries	Autres	7	7										1					
		Cyanobactéries	228	157							3	8	14				3	65	31
		Protéobactéries	13	13	1	1	1	1	1	1	2	1				1	1	1	1
Champignons	Autres	12790	12218	349	47	75			9	47	10		10		30		2		
	Lichens	5004	3350	434	119				166		424		103		553		251		
	Autres	11242	10311	336	428	441			137	114	21				5				
	Lichens	43	28	4	5	1			2		3				3		4		
	Chytridiomycètes	1	1																
Zygomycètes	8	7											1						
Chromistes	Algues	Algues brun-doré	85	78															
	Diatomées	2173	1456	43	88	3			264	327		274	10	601		61			
	Cryptophytes	1								1									
Plantes	Algues	Algues rouges	40	28	10	1	2		1						2		1		
	Algues vertes	1358	1190	10	3	4	4		2	12	4		1	16	1	7	20		
	Bryophytes	Mousses	2237	1006	4	251	180			183	6	491		24	0	490		11	
		Hépatiques et Anthocérotes	1669	330	264	373	232			40	3	322		67	0	536		15	
	Plantes vasculaires	Angiospermes	25916	9099	4770	1734	1619	486	488	601	793	2195	181	155	0	3621	345	1266	12
		Gymnospermes	327	86	3	2	2			10	1	15	0	1	0	51		1	0
Ptéridophytes		1527	203	349	297	242	2	2	43	82	275	9	4	0	285	50	251	0	
Protozoaires	Autres	18	7	6	1								5						
	Myxomycètes	508	476	36					70	88									
<b>TOTAL</b>		<b>152968</b>	<b>90130</b>	<b>26074</b>	<b>7166</b>	<b>4611</b>	<b>1136</b>	<b>1114</b>	<b>2159</b>	<b>2496</b>	<b>7653</b>	<b>460</b>	<b>1041</b>	<b>36</b>	<b>13472</b>	<b>725</b>	<b>5879</b>	<b>161</b>	
		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	

Tableau 17 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v13 : milieu continental

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	
Animaux	Arthropodes	Arachnides	5455	3539	600	202	107	39	34	6	53	156	4	65		554	13	366	8
		Crustacés	1305	1008	40	35	31	18	12	3	28	28	10	17		118	34	85	7
		Entognathes	1189	926	4	60	34	1	1	5	4	9		41		124	1	34	
		Insectes	72470	40559	17565	2965	1236	329	374	590	731	2930	153	115	0	5988	162	2524	30
		Myriapodes	697	543	5	40	32	7	5			1	9		2	72		23	
	Bryozoaires	13	13																
	Chordés	Amphibiens	199	50	124	6	7	3	4	1	4	2	0	0	0	2	1	1	0
		Mammifères	508	223	199	26	20	21	15	16	13	18	6	11	6	23	9	12	2
		Oiseaux	2053	655	808	309	229	140	115	328	128	133	57	101	19	225	46	171	41
		Poissons	840	119	465	42	53	9	22	9	54	72	13	8	0	150	36	66	3
		Reptiles	520	65	174	63	26	24	22	4	25	30	15	0	0	126	15	20	3
	Cnidaires	Hydrozoaires	10	9		1	1												
	Gastrotriches	52	53	1															
	Mollusques	Bivalves	50	45	10	3	3	1					0	0	0		0	0	0
		Gastéropodes	1999	743	93	90	88	55	25	6	92	117	4	3		343	35	608	2
	Onychophores	4	0	2	1					0									
	Porifères	10	6			1										2			1
	Rotifères	498	486											34					
	Tardigrades	72	68											3					
	Vers	Acanthocéphales	12	10															
		Annélides	467	379	24	20	4			2		1		10		40			
		Nématodes	683	489	91	79	82							3		49	1	1	
		Némertes	3	2															1
		Plathelminthes	631	590	3	4	4	2	1		2	4		3	1	21	1	6	
	Autres	7	7											1					
	Bactéries	Cyanobactéries	233	163							3	8	14				3	66	31
		Protéobactéries	17	16	1	2	2	2	1	1	2	2				1	1	1	1
	Champignons	Ascomycètes	Autres	13025	12236	384	54	103			9	47	50	1	11	133	5	28	
			Lichens	5013	3358	437	123	32			166		433		102		566		252
		Basidiomycètes	Autres	11593	10382	382	432	447			137	114	49			321		36	
			Lichens	43	28	4	5	1			2		3			3		4	
		Chytridiomycètes	2	2															
	Zygomycètes	8	7											1					
Chromistes	Algues	Algues brun-doré	105	98														1	
	Diatomées	2316	1607	43	89	3				297	336		274	10	602		144		
Cryptophytes	8	8								1									
Plantes	Algues	Algues rouges	40	28	10	1	2			1						2		1	
		Algues vertes	1401	1248	10	3	4	4		2	12	4		1		16	1	7	20
	Bryophytes	Mousses	2286	1009	213	253	181			182	7	492		31	0	460		19	
		Hépatiques et Anthocérotes	1633	330	264	373	232			40	3	322		67	0	504		16	
	Plantes vasculaires	Angiospermes	25784	8898	4750	1735	1614	486	487	603	793	2198	186	155	0	3643	343	1267	12
		Gymnospermes	330	85	3	2	2			9	1	15	0	1	0	54		1	0
Ptéridophytes	1542	203	347	302	242	2	2	43	82	276	9	4	0	296	50	251	0		
Protozoaires	Autres	68	13	7		1							52						
	Myxomycètes	508	476	36						70	88								
<b>TOTAL</b>		<b>155702</b>	<b>90782</b>	<b>27099</b>	<b>7320</b>	<b>4824</b>	<b>1143</b>	<b>1120</b>	<b>2165</b>	<b>2567</b>	<b>7785</b>	<b>472</b>	<b>1116</b>	<b>36</b>	<b>14438</b>	<b>757</b>	<b>6010</b>	<b>163</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>	

Tableau 18 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v14 : milieu continental

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI		
Animaux	Arthropodes	Arachnides	5731	3607	635	228	130	39	48	6	58	174	4	74		689	14	378	9	
		Crustacés	1397	1011	57	37	32	18	14	3	28	31	10	28		179	34	86	7	
		Entognathes	1191	928	4	60	34	1	1	5	4	9		41		126	1	33		
		Insectes	74688	41218	18499	3041	1408	340	460	590	779	3003	161	119	0	6513	172	2544	30	
		Myriapodes	781	552	12	44	47	8	10		1	9		2		129		23		
	Bryozoaires	13	13	1																
	Chordés	Amphibiens	199	50	124	6	7	3	4	1	3	2	0	0	0	2	1	1	0	
		Mammifères	528	224	197	31	22	20	16	16	12	17	6	11	6	27	8	14	2	
		Oiseaux	2058	657	808	309	234	140	156	328	128	136	57	101	19	226	46	171	41	
		Poissons	844	121	465	43	54	9	24	10	55	73	13	8	0	149	36	66	3	
		Reptiles	521	66	175	65	26	24	22	4	25	30	15	0	0	126	15	20	3	
	Cnidaires	Hydrozoaires	11	9		1	1							1						
	Gastrotriches	51	52	1																
	Mollusques	Bivalves	53	45	13	3	3	1					0	0	0		0	0	0	
		Gastéropodes	1994	740	92	85	81	58	34	6	95	119	7	4		351	35	608	2	
	Onychophores	4	0	2	1				0											
	Porifères	13	6			1										5			1	
	Rotifères	499	489											34						
	Tardigrades	73	68	1										3						
	Vers	Acanthocéphales	18	11								2				6				
		Annélides	485	384	25	20	4			2	6	7		9		63		2		
		Nématodes	784	519	115	84	87				2	55		4		58	2	3		
		Némertes	3	2															1	
		Plathelminthes	676	597	10	5	4	2	1		2	14		3	1	43	1	8		
	Autres	46	46										1					2		
	Bactéries	Cyanobactéries	275	206							5	8	14				3	66	31	
		Protéobactéries	72	63	7	2	4	2	1	1	2	6				1	1	5	1	
	Champignons	Ascomycètes	Autres	13308	12455	450	58	122			9	47	56	1	12		135	5	20	
			Lichens	4969	3317	436	123	32			166		433		101		564		251	
		Basidiomycètes	Autres	11774	10505	400	432	448			137	114	124				321		36	
			Lichens	42	27	4	5	1			2		3				3		4	
	Chytridiomycètes	4	4																	
	Chromistes	Algues	Algues brun-doré	128	123														1	
Diatomées		2425	1722	43	90	3				297	335		273	10	606		144			
Cryptophytes	9	9								1										
Plantes	Algues	Algues rouges	43	31	9	1	2			1						2		1		
		Algues vertes	1511	1364	10	3	4	4		2	12	4		1		16	1	7	20	
	Bryophytes	Mousses	2305	1011	213	253	181			182	8	495		41	0	462		28		
		Hépatiques et Anthocérotes	1638	329	264	365	232			42	5	319		67	0	505		28		
	Plantes vasculaires	Angiospermes	25145	8027	4757	1734	1612	488	487	601	861	2206	188	155	0	3672	344	1272	30	
Gymnospermes		321	45	3	2	2			9	1	15	0	1	0	54		1	0		
Ptéridophytes	1529	210	347	301	242	2	2	43	80	276	9	4	0	299	50	258	0			
Protozoaires	Autres	165	104	11	33	31						1	54	1			2			
	Myxomycètes	508	476	36						70	88									
<b>TOTAL</b>		<b>158832</b>	<b>91443</b>	<b>28226</b>	<b>7465</b>	<b>5091</b>	<b>1159</b>	<b>1280</b>	<b>2166</b>	<b>2701</b>	<b>8051</b>	<b>485</b>	<b>1152</b>	<b>37</b>	<b>15332</b>	<b>769</b>	<b>6082</b>	<b>182</b>		

Tableau 19 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v15 : milieu continental

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	
Animaux	Arthropodes	Arachnides	5942	3718	660	232	135	40	49	6	101	216	4	73	4	698	57	377	9
		Crustacés	1434	1015	64	49	36	18	14	3	28	42	12	29		182	34	89	7
		Entognathes	1190	928	4	60	34	1	1	5	4	9		41		125	1	33	
		Insectes	75770	41679	18837	3147	1524	362	464	589	796	3173	163	167	0	6547	207	2533	30
		Myriapodes	808	562	26	44	46	8	10		18	9	2	2		129		23	
	Bryozoaires	13	13	1															
	Chordés	Amphibiens	205	52	125	6	7	4	4	1	3	2	0	0	0	2	1	1	0
		Mammifères	526	223	197	32	22	20	16	16	12	17	6	11	6	27	8	14	2
		Oiseaux	2062	658	808	316	235	140	156	328	128	136	57	101	19	226	46	173	41
		Poissons	850	123	466	45	54	9	24	11	57	73	13	8	0	151	36	68	3
		Reptiles	529	66	175	66	27	25	22	4	26	31	18	0	0	126	16	20	3
	Cnidaires	Hydrozoaires	12	10		1	1							1					
	Gastrotriches	54	54	2															
	Mollusques	Bivalves	55	47	13	3	3	1					0	0	0		0	0	0
		Gastéropodes	2000	740	93	92	81	56		33	6	95	119	7	4	351	35	610	2
	Onychophores	4	0	2	1					0									
	Porifères	13	6			1										5			1
	Rotifères	499	489											34	0				
	Tardigrades	75	69	1								1		3					
	Vers	Acanthocéphales	19	12								2				6			
		Annélides	529	397	30	34	41	3	1	2	6	7		11		65		5	
		Nématodes	994	688	137	98	93				2	64		4		59	2	12	
		Némertes	4	3															1
		Plathelminthes	707	622	11	10	6	3	1		2	14		5	1	45	1	8	
	Autres	89	89	1								1		1				2	
	Bactéries	Cyanobactéries	320	250	1	1					5	9	14			1	3	69	31
		Protéobactéries	147	131	8	3	6	3	2	2	4	10				2	2	9	1
	Champignons	Ascomycètes	Autres	13936	12758	551	95	162		13	49	142		15		243	5	55	
			Lichens	4454	3008	389	120	32			163		401	3	99		477		215
		Basidiomycètes	Autres	11937	10555	576	444	458			137	114	159			326		36	
			Lichens	37	28	5	6	1			2		2			2		3	
		Chytridiomycètes	5	5															
	Chromistes	Algues	Algues brun-doré	129	124														1
Diatomées		2456	1731	45	93	3			0	298	337	0	286	10	613		146		
Cryptophytes	9	9								1									
Plantes	Algues	Algues rouges	52	37	13	1	2			1					3		2	1	
		Algues vertes	1575	1427	10	4	4	4		2	12	4		3		16	1	10	20
	Bryophytes	Mousses	2310	1016	213	253	181			182	12	493		41	0	465		28	
		Hépatiques et Anthocérotes	1659	330	266	366	232			42	5	319		67	0	519		55	
	Plantes vasculaires	Angiospermes	24484	7978	4765	1730	1605	489	487	607	861	2199	187	155	0	3693	344	1274	30
		Gymnospermes	311	45	3	2	2			10	1	15	0	1	0	54	0	1	0
Ptéridophytes	1547	211	347	301	243	2	2	44	80	278	9	7	0	302	50	261	0		
Protozoaires	Autres	172	106	11	33	31					6		55	1			3		
	Myxomycètes	502	477	36	1	1				70	87				1		1		
<b>TOTAL</b>		<b>160425</b>	<b>92489</b>	<b>28892</b>	<b>7689</b>	<b>5309</b>	<b>1188</b>	<b>1286</b>	<b>2176</b>	<b>2790</b>	<b>8377</b>	<b>495</b>	<b>1225</b>	<b>41</b>	<b>15461</b>	<b>849</b>	<b>6137</b>	<b>182</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>	

## Q.II. Milieu continental : Insectes

Tableau 20: Nombre de taxons terminaux par ordre et par territoire pour TAXREF v12 : insectes

	TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI
Archaeognatha	57	54												2		0	1
Blattodea	424	38	255	50	5	3	7	2	12	29		0	0	60	2	29	1
Coleoptera	23594	11552	6389	1404	453	83	84	199	287	1078	15	49	0	2083	33	771	2
Dermaptera	91	19	45	14	1			1	3	8			0	18	1	9	1
Diptera	11140	8688	723	244	92	29	6	86	88	197	25	31	0	766	23	390	3
Embioptera	4	2											0	1		1	
Ephemeroptera	235	147	25	11				1		2			0	45		0	
Hemiptera	6047	3560	1001	354	148	47	32	33	22	416		8	0	693	25	414	6
Hymenoptera	11378	8687	1463	186	78	19	22	41	98	369	42	4	0	474	40	198	5
Lepidoptera	14131	5712	6154	457	312	126	189	183	158	631	53	5	0	644	13	516	7
Mantodea	132	8	113	2	1	0	0	0	2	2	5	0	0	3	0	1	0
Mecoptera	10	10											0			0	
Megaloptera	9	3	5										0			0	
Neuroptera	252	168	25	11		3		1		22			0	18		14	
Odonata	489	102	254	39	30	9	10	17	34	23			0	58	14	20	2
Orthoptera	922	259	346	31	12	6	18	5	3	38	10		0	199	1	29	
Phasmida	114	4	57	9	3				1	5			0	34	1	2	
Plecoptera	197	195	1										0			0	
Psocodea	307	117	20	17	4	1		3		28		4	0	75	1	89	2
Raphidioptera	17	17											0			0	
Siphonaptera	129	114	12	1			1	2		1			0	4		4	
Strepsiptera	15	13	1	1									0			0	
Thysanoptera	453	264	6	72	30	1	1			47		1	0	75	1	64	
Trichoptera	842	487	36	41	24			17	9	9			0	226		0	
Zygentoma	28	17		6				1					0	3		5	
<b>TOTAL</b>	<b>71017</b>	<b>40237</b>	<b>16931</b>	<b>2950</b>	<b>1193</b>	<b>327</b>	<b>370</b>	<b>592</b>	<b>717</b>	<b>2905</b>	<b>150</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>5481</b>	<b>155</b>	<b>2556</b>	<b>30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>

Tableau 21: Nombre de taxons terminaux par ordre et par territoire pour TAXREF v13 : insectes

	TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI
Archaeognatha	58	54												3		0	1
Blattodea	442	38	261	49	18	6	10	2	13	29		0	0	67	2	29	1
Coleoptera	24221	11583	6555	1403	467	82	84	198	289	1089	18	56	0	2495	38	773	2
Dermaptera	91	19	45	14	1			1	3	8			0	18	1	9	1
Diptera	11404	8904	761	242	92	29	6	86	90	201	25	33	0	807	23	361	3
Embioptera	4	2											0	1		1	
Ephemeroptera	235	146	25	11				1		2			0	45		0	
Hemiptera	6206	3588	1087	370	154	47	32	33	23	417		8	0	737	25	414	6
Hymenoptera	11686	8710	1769	188	85	19	23	41	99	367	42	5	0	473	42	198	7
Lepidoptera	14181	5725	6171	459	314	126	189	182	162	645	53	6	0	648	13	516	7
Mantodea	130	8	110	1	1	0	0	0	2	3	5	0	0	3	0	2	0
Mecoptera	10	10														0	
Megaloptera	9	3	5		1											0	
Neuroptera	266	177	28	12		3		1	3	20			0	18		14	
Odonata	489	104	253	38	29	9	10	17	34	23		1	0	56	14	18	2
Orthoptera	922	260	345	31	12	6	18	5	3	38	10		0	199	1	29	
Phasmida	121	4	61	9	4				1	5			0	34	1	2	
Plecoptera	199	197	1										0			0	
Psocodea	308	118	20	17	4	1		3		28		4	0	75	1	89	2
Raphidioptera	18	18														0	
Siphonaptera	130	116	12	1			1	2		1		1	0	4		4	
Strepsiptera	15	13	1	1												0	
Thysanoptera	454	265	6	72	30	1	1			47		1	0	75	1	64	
Trichoptera	859	489	50	41	24			17	9	9			0	227		0	
Zygentoma	28	17		6				1					0	3		5	
<b>TOTAL</b>	<b>72486</b>	<b>40568</b>	<b>17566</b>	<b>2965</b>	<b>1236</b>	<b>329</b>	<b>374</b>	<b>590</b>	<b>731</b>	<b>2932</b>	<b>153</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>5988</b>	<b>162</b>	<b>2528</b>	<b>32</b>
	TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI

Tableau 22: Nombre de taxons terminaux par ordre et par territoire pour TAXREF v14 : insectes

	TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI
Archaeognatha	58	54												3		0	1
Blattodea	464	37	269	49	20	6	12	2	13	29		0	0	85	2	29	1
Coleoptera	24678	11658	6774	1435	529	86	114	198	300	1093	18	56	0	2611	39	783	2
Dermaptera	108	23	57	14	2		2	1	3	8			0	18	1	9	1
Diptera	11993	9250	930	271	108	33	21	86	94	222	25	32	0	841	24	363	3
Embioptera	4	2											0	2		1	
Ephemeroptera	239	148	27	11	2			1		2			0	45		0	
Hemiptera	6471	3604	1253	377	186	47	53	33	23	419		8	0	869	26	416	6
Hymenoptera	12034	8882	1861	191	121	20	40	41	109	378	50	5	0	526	42	203	7
Lepidoptera	14459	5753	6328	462	321	127	185	182	184	679	53	6	0	698	20	515	7
Mantodea	135	9	113	1	1	0	0	0	3	3	5	0	0	3	0	2	0
Mecoptera	10	10															
Megaloptera	9	3	5		1												
Neuroptera	267	177	28	12	1	3		1	3	20			0	19		14	
Odonata	495	104	255	38	31	9	10	17	34	23		1	0	56	14	18	2
Orthoptera	989	258	399	32	23	7	21	5	3	38	10		0	212	1	30	
Phasmida	143	3	81	9	4		1		1	5			0	35	1	2	
Plecoptera	199	197	1										0				
Psocodea	323	128	20	17	4	1		3		28		9	0	86	1	89	2
Raphidioptera	18	18															
Siphonaptera	130	116	12	1				2		1		1	0	4		4	
Strepsiptera	15	13	1	1													
Thysanoptera	466	265	17	73	30	1	1			48		1	0	88	1	65	
Trichoptera	969	499	68	41	24			17	9	9			0	309		0	
Zoraptera	1		1														
Zygentoma	28	17		6				1					0	3		5	
<b>TOTAL</b>	<b>74705</b>	<b>41228</b>	<b>18500</b>	<b>3041</b>	<b>1408</b>	<b>340</b>	<b>460</b>	<b>590</b>	<b>779</b>	<b>3005</b>	<b>161</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>6513</b>	<b>172</b>	<b>2548</b>	<b>32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>

Tableau 23: Nombre de taxons terminaux par ordre et par territoire pour TAXREF v15 : insectes

	TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI
Archaeognatha	58	54												3		0	1
Blattodea	468	38	271	49	20	7	13	2	13	31		0	0	85	2	31	1
Coleoptera	25006	11679	6988	1461	623	102	114	197	301	1114	19	64	0	2643	44	782	2
Dermaptera	109	23	57	15	2		2	1	3	8		2	0	18	1	9	1
Diptera	12259	9435	959	309	116	33	21	86	94	261	25	52	0	843	24	363	3
Embioptera	4	2											0	2		1	
Ephemeroptera	243	148	27	11	2			1	5	2			0	45		0	
Hemiptera	6540	3627	1274	409	189	47	53	33	23	440	3	11	0	870	49	415	6
Hymenoptera	12276	9062	1874	198	125	21	41	41	110	406	51	5	0	527	43	205	7
Lepidoptera	14586	5789	6373	463	330	130	186	182	193	718	53	12	0	698	24	513	7
Mantodea	138	9	113	2	1	1	1	0	3	3	5	0	0	3	0	2	0
Mecoptera	10	10														0	
Megaloptera	9	3	5													0	
Neuroptera	274	178	32	12	1	3		1	3	22			0	19		14	
Odonata	496	104	255	38	31	9	10	17	34	23		1	0	56	15	16	2
Orthoptera	1010	259	411	33	23	7	21	5	4	44	10	1	0	213	1	30	
Phasmida	142	3	79	9	4		1		1	5			0	35	1	2	
Plecoptera	201	199	1										0			0	
Psocodea	327	129	20	17	4	1		3		35	0	13	0	86	1	84	2
Raphidioptera	18	18											0			0	
Siphonaptera	130	116	12	1				2		1		1	0	4		4	
Strepsiptera	32	29	2	1									0			0	
Thysanoptera	470	265	17	74	30	1	1			55		5	0	90	2	64	
Trichoptera	968	497	68	42	24			17	9	9			0	309		0	
Zoraptera	1		1														
Zygentoma	28	17		6				1					0	3		5	
<b>TOTAL</b>	<b>75803</b>	<b>41693</b>	<b>18839</b>	<b>3150</b>	<b>1525</b>	<b>362</b>	<b>464</b>	<b>589</b>	<b>796</b>	<b>3177</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>6552</b>	<b>207</b>	<b>2540</b>	<b>32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>

### Q.III. Milieu marin

Tableau 24 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v12 : milieu marin

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	
Animaux	Arthropodes	Arachnides	113	76	1						7		2	23	7	1			
		Crustacés	8025	3104	152	551	224	177	57	16	611	610	316	256	154	2597	312	1273	163
		Pycnogonides	206	29	7	4	10	2			6	1	1	53	37	71	1	3	
	Bryozoaires	Bryozoaires	685	225			2			2				44	41	319		68	11
		Ascidies	687	111	30	104	55		2	7	36	5	33	93	43	286	1	99	4
		Mammifères	83	40	19	26	23	11	11	21	22	25	15	25	15	29	16	20	12
	Chordés	Oiseaux	282	127	87	87	74	53	42	85	43	56	22	78	19	71	15	69	17
		Poissons	5314	747	570	442	502	143	400	51	797	1055	508	230	68	2544	766	1470	204
		Reptiles	27	6	6	5	5	5	5	3	5	7	6	0	0	22	2	6	1
	Cnidaires	Hydrozoaires	668	223		79	113	5	11	3	69	71	53	41	33	238	1	24	1
		Octocoralliaires	487	36	1	65	54	29	23		67	67	3	2	8	284	2	21	
		Scléactiniaires	670	49		67	70	39	49		252	203	141	1		412	263	211	17
	Cténophores	Cténophores	21	17	1	3	2	4											
		Echinodermes	1404	316	2	83	43	58	25	10	95	191	99	96	77	501	89	309	30
		Gastrotriches	105	104		3													
	Mollusques	Autres	316	51	1	35	11	20	3	1	9	24	8	5	5	169	6	14	1
		Bivalves	1478	306	162	315	144	89	49	10	152	290	30	19	22	452	61	207	28
		Céphalopodes	130	49	23	21	21	1	5	1	5	7	2	26	2	21	8	6	
		Gastéropodes	7998	895	313	1293	745	365	231	13	932	1726	157	117	70	3521	408	1776	124
		Porifères	1428	657	16	108	154	37	32	3	18	19	2	127	43	386	3	48	15
		Rotifères	73	61	3						1	2		13					
	Siponcles	Siponcles	42	8				1			12	15	1	3	2	7		2	
		Tardigrades	46	23		11					7		3	1		3		1	
		Acanthocéphales	19	14										1	3				
	Vers	Annélides	1463	838	4	109	64	19	13	2	89	73		142	74	293	1	91	21
		Nématodes	175	74		6				1			21	9	24	33		7	
		Némertes	55	44				2			1			6	1				
		Plathelminthes	672	338		6	1	3			22	20		24	12	255		6	
	Bactéries	Cyanobactéries	138	57		4				1	7	19	29				13	75	21
		Protéobactéries	5	5							1								
Champignons	Ascomycètes	24	20			2													
	Lichens	5	3												1				
	Basidiomycètes	4	4			1													
Zygomycètes	Zygomycètes	2											2						
	Autres	282	218							11	5	2			3		77	2	
	Algues brun-doré	471	292		15	51	31	2	24	23	38	24	7	1	109	11	44	10	
Chromistes	Cryptophytes	5	4							2									
	Diatomées	1329	762	2	7	3	1			42	119	1	55	119	73		432		
	Foraminifères	1239	6							262				92	1049		288		
Plantes	Algues rouges	1343	717	1	70	181	90	2	13	128	142	66	44		245	124	218	40	
	Algues vertes	474	233		37	100	66	6	13	43	73	51	5		145	41	83	19	
	Plantes vasculaires Angiospermes	97	15	4	13	11	8	8	3	19	8	12	0	0	73	6	7	1	
<b>TOTAL</b>		<b>38090</b>	<b>10904</b>	<b>1405</b>	<b>3569</b>	<b>2666</b>	<b>1255</b>	<b>980</b>	<b>283</b>	<b>3796</b>	<b>4871</b>	<b>1608</b>	<b>1542</b>	<b>977</b>	<b>14214</b>	<b>2150</b>	<b>6955</b>	<b>742</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>	

Tableau 25 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v13 : milieu marin

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	
Animaux	Arthropodes	Arachnides	119	79	1						7		2	30	7				
		Crustacés	8290	3261	173	611	270	187	58	23	617	613	319	256	154	2613	314	1281	163
		Pycnogonides	240	31	7	4	50	2			6	1	1	53	37	71	1	3	
		Bryozoaires	692	232			2			2				44	41	319		68	11
	Chordés	Ascidies	692	113	30	104	55		2	7	37	9	33	93	43	286	1	99	4
		Mammifères	83	40	19	26	23	11	11	21	22	25	15	25	15	29	16	20	12
		Oiseaux	291	127	87	94	74	54	42	85	43	56	22	78	19	71	15	69	17
		Poissons	5346	767	574	444	504	165	402	54	797	1069	513	231	68	2545	766	1471	204
		Reptiles	27	6	6	5	5	5	5	4	6	7	6	0	0	22	2	6	1
	Cnidaires	Hydrozoaires	739	282		79	113	5	11	4	69	71	53	41	33	255	1	24	1
		Octocoralliaires	492	36	1	65	54	29	23		67	67	3	2	8	289	2	21	
		Scléactiniaires	675	49		67	70	39	49		258	194	178	1		410	264	212	17
		Cténophores	35	33	1	3	2		4										
		Echinodermes	1409	320	2	83	43	58	25	10	98	191	99	96	77	503	89	310	30
		Gastrotriches	105	104		3													
	Mollusques	Autres	323	57	1	36	11	20	3	1	9	24	8	5	5	169	6	14	1
		Bivalves	1490	318	162	316	145	89	49	12	152	290	30	20	22	452	61	207	28
		Céphalopodes	131	50	23	21	21	1	5	1	5	7	2	26	2	21	8	6	
		Gastéropodes	8107	935	320	1315	765	365	231	16	938	1734	158	117	69	3544	408	1786	124
			Porifères	1448	659	16	109	162	38	32	3	20	21	2	127	43	390	3	52
		Rotifères	74	62	3						1	2		13					
		Siponcles	42	8				1			12	15	1	3	2	7		2	
		Tardigrades	50	23		11					7		3	1		4		6	
	Vers	Acanthocéphales	19	14										1	3				
		Annélides	1598	960	4	109	65	19	13	8	89	74	0	144	74	310	1	93	33
		Nématodes	222	75	4	7	1			1			21	9	24	72		12	
		Némertes	55	44				2			1			6	1				
		Plathelminthes	840	497	2	6	1	3			22	20		24	12	258		8	
	Bactéries	Cyanobactéries	138	57		4				1	7	19	29				13	74	21
		Protéobactéries	12	12							1								
	Champignons	Ascomycètes	Autres	60	29	1		2			1	15							20
			Lichens	5	3												1		
		Basidiomycètes	7	4			1						3						
Zygomycètes		2											2						
Chromistes	Algues	Autres	350	292		1				12	11	2			3		77	2	
		Algues brun-doré	475	301		15	51	31	2	25	23	38	24	7	1	109	11	44	10
	Cryptophytes	6	5							2									
	Foraminifères	1268	42							45	120	1	54	119	71		445		
Plantes	Algues	Algues rouges	1359	741	1	70	182	90	2	13	128	142	66	44	245	124	218	40	
		Algues vertes	483	243		37	100	66	6	13	43	73	51	5	145	41	83	19	
	Plantes vasculaires	Angiospermes	101	18	4	13	11	8	8	3	19	8	12	0	0	73	6	7	1
<b>TOTAL</b>		<b>39238</b>	<b>11705</b>	<b>1444</b>	<b>3666</b>	<b>2786</b>	<b>1289</b>	<b>983</b>	<b>307</b>	<b>3825</b>	<b>4919</b>	<b>1654</b>	<b>1552</b>	<b>976</b>	<b>14337</b>	<b>2153</b>	<b>7025</b>	<b>754</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>	

Tableau 26 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v14 : milieu marin

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	
Animaux	Arthropodes	Arachnides	171	85	2	20					9	2	37	16	9				
		Crustacés	9032	3586	194	644	333	189	126	25	629	630	334	337	166	2752	317	1355	169
		Pycnogonides	264	44	7	4	53	2			7	4	3	53	39	73	1	3	
	Bryozoaires	758	299			2			2				50	41	320		71	11	
	Chordés	Ascidies	736	178	30	104	55	1	8	7	37	10	33	96	43	283	1	98	4
		Mammifères	83	40	19	26	24	11	12	21	22	25	15	25	15	29	16	20	12
		Oiseaux	294	127	87	94	75	54	53	85	43	58	22	78	19	71	15	69	17
		Poissons	5436	768	575	446	506	168	386	75	798	1085	513	231	68	2579	768	1479	204
		Reptiles	27	6	6	5	5	5	5	4	6	7	6	0	0	22	2	6	1
	Cnidaires	Hydrozoaires	841	305		80	113	5	11	4	69	74	53	45	33	331	1	26	1
		Octocoralliaires	531	55	1	69	63	29	23		67	68	3	3	8	298	4	22	
		Scléractiniaires	710	52	2	67	72	40	55		260	202	179	1		431	264	214	17
	Cténophores	37	35	1	3	2		5											
	Echinodermes	1473	340	3	86	44	59	35	10	103	195	103	120	77	520	90	310	30	
	Gastrotriches	108	107		3														
	Mollusques	Autres	351	81	1	36	11	20	9	1	9	26	8	7	5	169	6	16	1
		Bivalves	1640	435	163	317	148	89	51	12	152	316	30	25	22	466	61	211	28
		Céphalopodes	145	51	23	21	21	1	10	4	5	7	2	26	2	32	8	6	
		Gastéropodes	8586	1139	323	1379	812	364	257	17	950	1832	164	125	70	3639	411	1808	124
		Porifères	1477	670	16	110	164	38	35	3	20	21	2	128	43	397	3	61	15
	Rotifères	75	63	3						1	2		13						
	Siponcles	49	19				1			12	16	1	5	2	8		3		
	Tardigrades	54	27	0	11					7		3	1		4		6		
	Vers	Acanthocéphales	21	16										1	3				
		Annélides	1823	1136	4	108	65	19	18	8	89	75	1	152	74	318	1	109	62
		Nématodes	307	107	4	7	1			1	2	21	20	24	118	1	12		
		Némertes	60	47			2	2		1			1	6	2				
		Plathelminthes	964	526	3	10	1	3	2		22	23		24	12	340		16	
	Bactéries	Cyanobactéries	150	63		4				1	12	19	29				13	76	21
		Protéobactéries	262	211							1	35	3					52	
	Champignons	Ascomycètes	68	32	1		17				1	15						20	
		Lichens	5	3												1			
Basidiomycètes		8	5			1					3								
Chytridiomycètes	1	1																	
Chromistes	Algues	463	387		2	9	1	1		12	17	7			3		84	2	
	Algues brun-doré	510	329		15	51	31	2	25	24	39	25	7	2	114	11	46	11	
	Cryptophytes	18	15							2	1						1		
	Diatomées	1490	905	3	8	3	1			45	121	1	93	119	70		449		
Foraminifères	1290	74							261	1	1		92	1048		289			
Plantes	Algues	1393	760	2	70	182	90	2	13	128	144	67	44		252	124	223	40	
	Algues vertes	512	264		37	100	66	6	13	44	74	51	5		152	41	85	19	
	Plantes vasculaires	99	17	4	13	11	8	8	4	20	8	12			73	6	7	1	
<b>TOTAL</b>		<b>42322</b>	<b>13410</b>	<b>1477</b>	<b>3799</b>	<b>2944</b>	<b>1297</b>	<b>1122</b>	<b>335</b>	<b>3868</b>	<b>5155</b>	<b>1694</b>	<b>1753</b>	<b>1001</b>	<b>14924</b>	<b>2165</b>	<b>7253</b>	<b>790</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>	

Tableau 27 : Nombre de taxons terminaux par groupe et par territoire pour TAXREF v15 : milieu marin

		TOTAL	FR	GF	GUA	MAR	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	SA	TA	NC	WF	PF	CLI	
Animaux	Arthropodes	Arachnides	204	99	4	21	1				10	1	2	36	16	11		12	
		Crustacés	9393	3638	205	671	342	190	126	25	650	642	338	385	173	2893	324	1431	173
		Pycnogonides	269	45	7	4	54	2			7	6	3	56	39	73		1	3
		Bryozoaires	827	348		1	2			2				52	41	327		82	11
	Chordés	Ascidies	750	186	30	104	55	1	8	7	37	10	33	95	44	289	1	100	4
		Mammifères	84	40	19	26	24	11	12	21	22	25	15	25	15	29	16	20	12
		Oiseaux	294	127	87	95	76	54	53	85	43	58	22	78	19	71	15	69	17
		Poissons	5496	773	576	447	507	167	386	76	815	1105	513	231	68	2588	768	1502	204
		Reptiles	24	6	6	5	5	5	5	4	6	7	6	0	0	22	2	6	1
	Cnidaires	Hydrozoaires	907	316	27	81	113	5	11	4	70	75	53	63	33	349	1	51	1
		Octocoralliaires	607	58	8	80	71	31	23		68	69	4	10	10	332	5	33	
		Scléractiniaires	851	53	10	73	82	41	55	1	260	204	179	10		607	264	221	17
		Cténophores	38	35	1	3	2		5										1
		Echinodermes	1854	342	64	167	101	61	36	10	126	202	109	164	83	659	91	368	30
		Gastrotriches	121	119	2	3													
	Mollusques	Autres	359	83	1	37	11	20	9	1	9	26	8	8	5	171	6	18	1
		Bivalves	1654	437	163	317	148	89	51	12	152	321	30	25	22	466	61	223	28
		Céphalopodes	147	51	23	21	21	1	10	4	5	9	2	26	2	33	8	7	
		Gastéropodes	8732	1150	325	1384	818	366	258	17	976	1862	173	128	70	3696	415	1835	124
		Porifères	1557	680	16	117	177	39	35	3	21	31	4	154	43	409	3	71	15
		Rotifères	75	63	3						1	2		13					
		Siponcles	49	21				1			12	16	1	5	2	8		3	
		Tardigrades	71	39		16	2				7		3	1		8		8	
	Vers	Acanthocéphales	24	19										1	3				
		Annélides	2007	1211	9	117	75	25	18	8	93	77	2	172	74	349	1	154	62
		Nématodes	687	374	6	50	7			1		2	21	67	24	130	1	38	
		Némertes	119	103				2	2		1			2	6	2			
		Plathelminthes	1214	712	2	10	1	3	2		22	23		45	12	379		33	
	Bactéries	Cyanobactéries	162	74		7				1	13	20	29	1		2	13	79	21
		Protéobactéries	357	267							25	54	3	9				54	
Champignons	Ascomycètes	Autres	77	34	1		17			1	15				2		25		
	Lichens	3	2																
	Basidiomycètes	9	6			1					3								
	Chytridiomycètes	2	2																
Chromistes	Algues	Autres	499	408		2	9	1	2		16	28	7		10		95	2	
	Algues brun-doré	540	334		23	52	31	2	25	24	39	25	21	2	117	11	54	11	
	Cryptophytes	18	15							2	1						1		
	Diatomées	1529	926	3	8	4	1			45	124	1	94	119	80		455		
	Foraminifères	1330	81							261	1	1	2	92	1054		318		
Plantes	Algues	Algues rouges	1511	776	10	93	187	90	2	13	128	144	67	96	257	124	265	40	
	Algues vertes	547	276		44	102	66	6	13	44	74	51	9		152	41	114	19	
	Plantes vasculaires	Angiospermes	98	19	4	13	11	8	8	4	20	8	12	0	0	73	6	7	1
<b>TOTAL</b>		<b>45096</b>	<b>14348</b>	<b>1612</b>	<b>4040</b>	<b>3078</b>	<b>1311</b>	<b>1125</b>	<b>337</b>	<b>3992</b>	<b>5284</b>	<b>1717</b>	<b>2084</b>	<b>1017</b>	<b>15648</b>	<b>2178</b>	<b>7756</b>	<b>794</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>FR</b>	<b>GF</b>	<b>GUA</b>	<b>MAR</b>	<b>SM</b>	<b>SB</b>	<b>SPM</b>	<b>MAY</b>	<b>REU</b>	<b>EPA</b>	<b>SA</b>	<b>TA</b>	<b>NC</b>	<b>WF</b>	<b>PF</b>	<b>CLI</b>	

---

## Résumé

Après avoir rempli la planète internet d'informations, après avoir rempli nos carnets et nos ordinateurs de données de terrain, l'envie ou le besoin de partager la connaissance fait rapidement face à la nécessité de parler un langage commun et de disposer de référentiels. En matière de taxons biologiques, ces référentiels sont cruciaux tant le foisonnement des noms est à l'image de la diversité de ce qu'ils représentent.

Dans le cadre du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), le Muséum national d'Histoire naturelle est en charge de la réalisation du référentiel national sur la faune, la flore et la fonge de France métropolitaine et outre-mer. L'objectif du présent document est d'exposer le cadre méthodologique global, de la mise en œuvre à la diffusion, qui fonde ce référentiel TAXREF. En particulier, une composante essentielle réside dans le lien unique vers les référentiels globaux, respectant ainsi l'exigence de consolidation de la connaissance qui est le fondement de la nomenclature et la taxonomie. La gestion bibliographique, le suivi des modifications apportées au référentiel, les problématiques de gestion de données sont aussi des aspects fondamentaux mis en œuvre pour assurer la cohérence et la rigueur du référentiel et de l'utilisation qui en est faite.

**Mots-clés** : référentiel, espèces, méthodologie, diffusion.



**UMS PatriNat**  
Muséum national d'Histoire naturelle  
CP41 – 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire  
75005 Paris  
[www.patrinat.fr](http://www.patrinat.fr)



[www.ofb.gouv.fr](http://www.ofb.gouv.fr)



[www.cnrs.fr](http://www.cnrs.fr)



[www.mnhn.fr](http://www.mnhn.fr)